

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА



PREPIDIL® GEL ПРЕПИДИЛ ГЕЛ (Dinoprostone)

Моля, прочетете тази листовка!

Тази листовка е за лекарствения продукт ПРЕПИДИЛ ГЕЛ. Моля, прочетете я преди приемането на ПРЕПИДИЛ ГЕЛ. Тази информация ще Ви бъде полезна. Ако нещо не Ви е ясно или имате нужда от допълнителна информация, попитайте Вашия лекуващ лекар или фармацевт. Можете да пожелаете да прочетете отново тази информация, затова пазете тази листовка.

Името на това лекарство е ПРЕПИДИЛ и представлява гел за приложение върху шийката на матката. Лекарственото вещество е dinoprostone (динопростон).

Какво съдържа ПРЕПИДИЛ ГЕЛ?

ПРЕПИДИЛ ГЕЛ съдържа 0.5 мг от лекарственото вещество.

Помощни вещества: колоиден безводен силиций, триацетин.

ПРЕПИДИЛ ГЕЛ се предлага в опаковки с предварително напълнена спринцовка и катетър, поставени в пластмасова опаковка и картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба

PFIZER EUROPE MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, England CT13 9NJ

Производител

Pfizer Manufacturing N.V./S.A.

Rijksweg 12 B-2870, Puurs, Belgium, Puurs, Belgium

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕПИДИЛ ГЕЛ И ЗА КАКВО СЕ УПОТРЕБЯВА

Какъв тип лекарство е ПРЕПИДИЛ ГЕЛ

ПРЕПИДИЛ ГЕЛ принадлежи към група лекарства, наречени простагландини.

За какво се използва ПРЕПИДИЛ ГЕЛ

ПРЕПИДИЛ ГЕЛ се прилага при бременни жени на термин или близо до термина.

ПРЕПИДИЛ ГЕЛ се прилага за узряване (подготовка) на шийката на матката, когато има медицинска или акушерска необходимост за предизвикване на раждането.

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРЕПИДИЛ ГЕЛ

ПРЕПИДИЛ не трябва да се използва, ако имате:

- Алергия към ПРЕПИДИЛ ГЕЛ или други сходни лекарствени продукти, наречени простагландини.
- Алергия към някое от помощните вещества на лекарствения продукт.

Ако отговорът на някои от въпросите по-долу е ДА, уведомете Вашия лекар преди да приемете ПРЕПИДИЛ ГЕЛ:

- Многоплодна ли е бременността Ви (очаквате ли близнаци)?



- Имали ли сте 6 или повече предшестващи доносени бременности?
- Имали ли сте предходна маточна операция (напр. Цезарово сечение или друга операция на матката)?
- Имали ли сте неизяснено вагинално течение или кръвотечение по време на настоящата бременност?
- Има ли някакви особености на износваната бременност (неглавично предлежание, диспропорция между главата на плода и таза, нарушения на сърдечната честота на плода, състояния, предполагащи необходимост от оперативна интервенция)?
- Страдате ли от сърдечно-съдово, чернодробно или бъбречно заболяване?
- Страдате ли от астма?
- Имате ли глаукома или повишено вътреочно налягане?
- Над 35 години ли сте?

КАК ДА СЕ ПРИЛАГА ПРЕПИДИЛ ГЕЛ

ПРЕПИДИЛ ГЕЛ се прилага само в болнични условия от лекар, специалист акушер-гинеколог.

Ако не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар.

ПРЕДИЗВИКВА ЛИ ПРЕПИДИЛ ГЕЛ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

ПРЕПИДИЛ ГЕЛ, както всички лекарствени продукти, може да предизвика някои нежелани лекарствени реакции.

ПРЕПИДИЛ ГЕЛ може да предизвика нежелани лекарствени реакции както при Вас, така и при Вашето бебе.

Нежелани лекарствени реакции за майката са алергични реакции, диария, гадене, повръщане, болки в гърба, чувство на затопляне във вагината, в изключително редки случаи – нарушения на съсирването на кръвта.

Нежелани лекарствени реакции при плода: изменена сърдечна честота на плода.

Уведомете Вашия лекар, ако забележите някаква друга нежелана реакция.

КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО

Съхранявайте Вашето лекарство при температура между 2 и 8°C (в хладилник).

Пазете всички лекарства на недостъпно за деца място!

Грижете се за Вашето лекарство! Това лекарство е предназначено лично за ВАС. НЕ ТРЯБВА да го давате на други. То може да не е подходящо за тях, дори и ако техните симптоми са сходни с Вашите.

Не приемайте лекарството след датата на изтичане на срока на годност, обозначена върху опаковката.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията в тази листовка е само за ПРЕПИДИЛ ГЕЛ. Тази листовка не съдържа цялата информация за това лекарство. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последна редакция на текста

