

ИАЛ
ОДОБРЕНОІ
ДАТА 31.01.06г.

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

PROSTIN® E₂
ПРОСТИН Е₂
(Dinoprostone)

Моля, прочетете тази листовка!

Тази листовка е за лекарствения продукт ПРОСТИН Е₂. Моля, прочетете я преди приемането на ПРОСТИН Е₂. Тази информация ще Ви бъде полезна. Ако нещо не Ви е ясно или имате нужда от допълнителна информация, попитайте Вашия лекуващ лекар или фармацевт. Можете да пожелаете да прочетете отново тази информация, затова пазете тази листовка.

Името на това лекарство е ПРОСТИН Е₂ и представлява таблетки за вагинално приложение. Лекарственото вещество е dinoprostone (динопростон).

Какво съдържа ПРОСТИН Е₂?

ПРОСТИН Е₂ вагинални таблетки съдържат 3 мг от лекарственото вещество.

Помощни вещества: царевично нишесте, микрокристална целулоза, лактоза, колоиден безводен силиций, магнезиев стеарат.

ПРОСТИН Е₂ се предлага в опаковки с стъклено шише или двуслойна лента с 4 таблетки, поставени в картонена кутия

Притежател на разрешението за употреба

PFIZER EUROPE MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, England CT13 9NJ

Производител

Pfizer Manufacturing N.V./S.A.

Rijksweg 12 B-2870, Puurs, Belgium

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОСТИН Е₂ И ЗА КАКВО СЕ УПОТРЕБЯВА

Какъв тип лекарство е ПРОСТИН Е₂

ПРОСТИН Е₂ принадлежи към група лекарства, наречени простагландини.

За какво се използва ПРОСТИН Е₂

ПРОСТИН Е₂ вагинални таблетки се прилага при бременни жени на термин или близо до термина за предизвикване на раждането.

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОСТИН Е₂

ПРОСТИН Е₂ не трябва да се използва, ако имате:

- Алергия към ПРОСТИН Е₂ или други сходни лекарствени продукти, наречени простагландини.
- Алергия към някое от помощните вещества на лекарствения продукт.

Ако отговорът на някои от въпросите по-долу е **ДА**, уведомете Вашия лекар преди да приемете ПРОСТИН Е₂:

- Многоплодна ли е бременността Ви (очаквате ли близната?)
- Имали ли сте 6 или повече предшестващи доносени бременности?
- Имали ли сте предходна маточна операция (напр. Цезарово съчение или друга операция на матката)?



- Имати ли сте неизяснено вагинално течение или кръвотечение по време на настоящата бременност?
- Има ли някакви особености на износваната бременност (неглавично предлежание, диспропорция между главата на плода и таза, нарушения на сърдечната честота на плода, състояния, предполагащи необходимост от оперативна интервенция)?
- Страдате ли от сърдечно-съдово, чернодробно или бъбречно заболяване?
- Страдате ли от астма?
- Имате ли глаукома или повишено вътречно налягане?
- Над 35 години ли сте?

КАК ДА СЕ ПРИЛАГА ПРОСТИН Е₂

ПРОСТИН Е₂ се прилага само в болнични условия от лекар, специалист акушер-гинеколог.

Ако не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар.

ПРЕДИЗИВИКВА ЛИ ПРОСТИН Е₂ НЕЖЕЛANI ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

ПРОСТИН Е₂ вагинални таблетки, както всички лекарствени продукти, може да предизвика някои нежелани лекарствени реакции.

ПРОСТИН Е₂ вагинални таблетки може да причини нежелани лекарствени реакции както при Вас, така и при Вашето бебе.

Нежелани лекарствени реакции при майката са алергични реакции, диария, гадене, повръщане, болки в гърба, чувство на затопляне във вагината, треска, високо кръвно налягане, астма, бронхоспазъм, в изключително редки случаи – нарушения на съсирването на кръвта.

Нежелани лекарствени реакции при плода: изменена сърдечна честота на плода.

Уведомете Вашия лекар, ако забележите някаква друга нежелана реакция.

КАК ДА СЪХРАНИЯВАТЕ ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО

Съхранявайте Вашето лекарство при температура между 2 и 8°C (в хладилник).

Пазете всички лекарства на недостъпно за деца място!

Грижете се за Вашето лекарство! Това лекарство е предназначено лично за ВАС. НЕ ТРЯБВА да го давате на други. То може да не е подходящо за тях, дори и ако техните симптоми са сходни с Вашите.

Не приемайте лекарството след датата на изтичане на срока на годност, обозначената върху опаковката.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията в тази листовка е само за ПРОСТИН Е₂. Тази листовка не съдържа цялата информация за това лекарство. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последна редакция на текста

