




**BERLIN-CHEMIE**  
**MENARINI GROUP**

**ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА**

**Mezym<sup>®</sup> forte 20000**

**Мезим<sup>®</sup> форте 20000**




Моля, прочетете внимателно следната листовка за пациента, преди да започнете Вашето лечение. За допълнителна информация се обръщайте към Вашия лекар или фармацевт.

## ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

**Mezym® forte 20000**  
**Мезим® форте 20000**

**Какво съдържа Вашето лекарство?**



*Лекарствено вещество*

Една стомашно-устойчива филмирана таблетка *Мезим® форте 20000* съдържа свински панкреатин (porcine pancreatin) с минимална активност от:

Lipase	20000 Ph. Eur. U.
Amylase	12000 Ph. Eur. U.
Proteases	900 Ph. Eur. U.

*Помощни вещества*

Лактоза монохидрат, микрокристална целулоза, колоидален безводен силиций, кросповидон, магнезиев стеарат, хипромелоза, метакрилова киселина - етил акрилат кополимер, триетил цитрат, талк, симетикон емулсия, макрогол 6000, натриева кармелоза, полисорбат 80, оцветители Е 171, есенция ванилия, есенция бергамот.

*Опаковка*

50, 100 или 200 стомашно-устойчиви филмирани таблетки.

**Как действа *Мезим® форте 20000*?**

*Мезим® форте 20000* съдържа панкреасни храносмилателни ензими (ензими на задстомашната жлеза).

**Какво лекува *Мезим® форте 20000*?**

*Мезим® форте 20000* се прилага при:

- нарушено образуване и освобождаване на храносмилателни ензими от панкреаса, съпроводено от храносмилателни оплаквания;
- при съпътстващо хирургично отстранен стомах или тънко черво, функционално ускорен чревен пасаж, нарушения в чернодробно-жлъчната система, неуточнено нарушено храносмилане;
- при едновременно консумиране на трудносмилаеми зеленчуци, мазни или необичайни храни;

*Мезим® форте 20000* е подходящ за премахване на газовете в червата преди образни диагностични процедури (рентгеново изследване, ултразвук) когато е налице повишено образуване и натрупване на газове в корема (метеоризъм) вследствие на гореизброените храносмилателни нарушения.

**Кога не трябва да се прилага *Мезим® форте 20000*?**

Тово лекарство не трябва да се прилага при остро възпаление или изострено хронично възпаление на панкреаса по време на активната фаза на болеста. Понякога обаче е целесъобразно приложението на лекарството във фазата на възстановяване с диета, когато са налице все още белези на намалена функция на панкреаса.

**Какви взаимодействия може да има между *Мезим® форте 20000* и други лекарства, които приемате?**

До момента не са известни взаимодействия с други лекарства.



**Може ли да се прилага Мезим® форте 20000 по време на бременност и кърмене?**

Няма ограничения за приложението на Мезим® форте 20000 при бременност и кърмене.

**Повлиява ли Мезим® форте 20000 способността за шофиране и работа с машини?**

Не повлиява.

**Как и колко време трябва да се прилага Мезим® форте 20000?**

Дозировката на Мезим® форте 20000 се определя от тежестта на нарушеното храносмилане и е индивидуална. В случай че не е предписано друго, обикновено се приемат 1 - 2 таблетки по време на хранене. Дозата може да е значително по-висока в зависимост от вида на храната и тежестта на храносмилателните нарушения.

Особено при пациенти с кистична фиброза, дозировката не трябва да надвишава количеството ензими, необходимо за храносмилането на мазнините, като се има предвид количеството и състава на храната. По-голямо увеличение на дозата може да се извършва под лекарско наблюдение и се определя от подобренито на симптомите (напр. мазни изпражнения и коремна болка). Не трябва да се надвишава дневна доза от 15000-20000 U/kg lipase. Дозата при децата се определя от лекар.

Филмираните таблетки трябва да се поглъщат цели. Приемат се с обилно количество течност.

Продължителността на лечението е неограничена и зависи от оплакванията. Продължителността на лечението при децата се определя от лекар.

**Какви нежелани лекарствени реакции може да причини Мезим® форте 20000?**

Няма риск от нежелани лекарствени реакции или усложнения дори при продължителна и редовна употреба на Мезим® форте 20000 при нарушена функция на панкреаса.

В изолирани случаи след приложение на панкреатин са описани алергични реакции. В изолирани случаи при пациенти, страдащи от кистична фиброза, след приложение на високи дози панкреатин са описани стеснения в долната част на тънките черва.

Чести усложнения при пациенти с кистична фиброза са запек и чревна непроходимост. При оплаквания, характерни за чревна непроходимост, трябва да се има предвид възможността за стесняване на червата.

**Какво трябва да се направи при приемане на повече таблетки Мезим® форте 20000, отколкото е необходимо?**

Неблагоприятни ефекти в този случай са необичайни.

**Как да съхранявате Мезим® форте 20000?**

Няма специални условия за съхранение.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

**Притежател на разрешението за употреба**

Berlin-Chemie (Menarini Group)

Glénicker Weg 125

12489 Berlin, Germany

**Срок на годност**

3 години

Да не се използва след срока на годност, обозначен на опаковката!

**Дата на последната редакция на листовката**

Март, 2004 год.

