

Информация за пациента

ИАЛ
ОДОБРЕН ОТ
ДАТА 31.10.2005

Уважаеми пациенти, моля прочетете внимателно тази листовка, защото тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към лекуващия лекар.

GeloMyrtol® / GeloMyrtol® forte ГелоМиртол / ГелоМиртол форте

Какво представлява ГелоМиртол/ГелоМиртол форте?

ГелоМиртол/ГелоМиртол форте са стомашно-устойчиви капсули, по 20 броя в опаковка.

Една стомашно-устойчива капсула ГелоМиртол съдържа:

Лекарствено вещество: Myrtol Standardized 120mg, включващ минимум 30 mg limonene /лимонен/, 30 mg cineole /цинеол/ и 8 mg α-pinene /пинен/.

Помощни вещества: Средно-верижни триглицериди, желатин, глицерол 85 %, хипромелоза фталат, дигутил фталат, сорбитол течен (некристализиран), хлороводородна киселина 13 %.

Една стомашно-устойчива капсула ГелоМиртол Форте съдържа:

Лекарствено вещество: Myrtol Standardized 300mg, включващ минимум 75 mg limonene /лимонен/, 75 mg cineole /цинеол/ и 20 mg α-pinene /пинен/.

Помощни вещества: рапично масло, желатин, глицерол 85%, хипромелоза фталат, дигутил фталат, сухо вещество от 70% сорбитолов разтвор (некристализиран), хлороводородна киселина 13%.

За какво се използва ГелоМиртол/ГелоМиртол форте и как действа?

ГелоМиртол/ГелоМиртол форте се използва за симптоматично лечение на остри и хронични бронхити и синуити.

ГелоМиртол/ГелоМиртол форте повлиява секрецията и кашлицата при заболявания на дихателните пътища, втечнява сгъстения секрет, засилва отделянето му, улеснява отхрачването и има противовъзпалителен ефект.

Кога не трябва да използвате ГелоМиртол/ГелоМиртол форте?

ГелоМиртол/ГелоМиртол форте не трябва да се прилага при свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

Какво трябва да имате предвид по време на бременност и кърмене?

Въпреки че липват съобщения за тератогенен ефект по време на бременност, особено през първото тримесечие, ГелоМиртол/ГелоМиртол форте може да се прилага само след консултация с лекар.

Възможно е преминаване на ГелоМиртол/ГелоМиртол форте в майчиното мляко поради липофилни свойства.

Какво трябва да знаеете при шофиране и работа с машини?

ГелоМиртол/ГелоМиртол форте няма влияние върху способността за шофиране и работа с машини.



Специални предупреждения

Съдържа глицерол, който при високи дози може да причини главоболие, стомашно дразнене и диария.

Ако след прием на лекарствения продукт симптомите продължават или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар.

Кои други продукти оказват влияние върху ефекта на ГелоМиртол/ГелоМиртол форте или могат да бъдат повлияни?

Няма известни взаимодействия с други лекарства или с хранни.

Как можете правилно да използвате ГелоМиртол/ГелоМиртол форте?

Ако не е предписано друго да се спазват следните указания:

Дозиране на ГелоМиртол

При остри заболявания възрастни и деца над 10 години приемат по 2 капсули ГелоМиртол 120 mg 4-5 пъти дневно; при хронични заболявания се приемат по 2 капсули 3 пъти на дневно, като тази дозировка се препоръчва и за поддържащо лечение. Деца от 4 до 10 години по 1 капсула ГелоМиртол 120 mg 4-5 пъти дневно при остри заболявания и по 1 капсула 3 пъти дневно при хронични заболявания.

Дозиране на ГелоМиртол форте

При остри заболявания възрастни и деца над 10 години приемат по 1 капсула ГелоМиртол форте 3-4 пъти дневно; при хронични заболявания се приема по 1 капсула 2 пъти на ден, като тази дозировка се препоръчва и за продължително лечение.

При хронични бронхити, за улесняване сутрешното отхрачване се приема допълнително по 2 капсули ГелоМиртол или 1 капсула ГелоМиртол форте допълнително вечер преди лягане.

Капсулите ГелоМиртол/ГелоМиртол форте се приемат $\frac{1}{2}$ час преди хранене с голямо количество хладна течност. За по-добър сън последната доза да се взима преди лягане.

Колко дълго можете да приемате ГелоМиртол/ГелоМиртол форте?

Продължителността на лечението с ГелоМиртол/ГелоМиртол форте зависи от оплакванията. При хронични заболявания на дихателните пътища е възможно приемане на медикамента продължително време.

Какво трябва да предприемете, ако сте приемали по-голямо количество ГелоМиртол/ГелоМиртол форте?

Ако сте приемали по-голямо количество ГелоМиртол/ГелоМиртол форте, следните мерки трябва да бъдат предприети от Вашия лекар:

Течен парафин 3ml/kg тегло, промивка на стомаха с 5% разтвор на натриев бикарбонат, поставяне на кислородна маска.

Какви нежелани реакции може да предизвика ГелоМиртол/ГелоМиртол форте?

В единични случаи могат да се появят оплаквания в стомашно-чревната област, като подуване, болка, гадене, диария, както и да настъпи раздвижване на намиращи се в жълчката и бъбреците камъни.



В отделни случаи се наблюдават алергични реакции /напр. обрив по кожата, отоци по лицето, задух или нарушения в кръвообращението/.
При появя на странични реакции, които не са споменати в листовката, веднага информирайте Вашия лекар или фармацевт.

Срок на годност

Срокът на годност на продукта е 3 години.

Да не се употребява след изтичане срока на годност, отбелязан на опаковката!

Условия на съхранение

Да се съхранява на сухо място, при температура под 25 °C!

Да се съхранява на места, недостъпни за деца!

Производител:

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co.
Kieler Strasse 11
D-25551 Hohenlockstedt, Germany

и

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co.
Kaddenbusch 11
D-25578 Dageling, Germany

Притежател на разрешението за употреба:

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co.
Kieler Strasse 11
D-25551 Hohenlockstedt, Germany

Медицинско представителство в България:

Либра АД

Дата на последна редакция на листовката

Октомври 2005

