



ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Flavamed® Cough Solution

Флавамед® разтвор против кашлица

Моля, прочетете внимателно следната листовка за пациента, преди да започнете Вашето лечение. За допълнителна информация се обръщайте към Вашия лекар или фармацевт.

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Flavamed® Cough Solution

Флавамед® разтвор против кашлица



Какво съдържа Вашето лекарство?

Една мерителна лъжичка с 5 ml разтвор съдържа 15 mg ambroxol hydrochloride като лекарствено вещество и следните помощни вещества: сорбитол 70 % (не-кристиализиращ) 1.75 g (=0.15 хлебни единици), бензоена киселина 5.75 mg, глицерол (85 %), хидроксиглюкоза, аромат малина и пречистена вода.

Опаковка

Флавамед® разтвор против кашлица е в етикетирана бутилка от по 60 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml или 250 ml, поставена в картонена кутия, с приложена мерителна лъжичка и листовка за пациента.

Как действа Флавамед® разтвор против кашлица?

Флавамед® разтвор против кашлица втечнява гъстия бронхиален секрет и спомага отделянето му, улеснява отхрачването и облекчава кашлицата.

Как лекува Флавамед® разтвор против кашлица?

Флавамед® разтвор против кашлица се прилага за втечняване на секрета при остри и хронични заболявания на бронхите и белия дроб, съпроводени с гъст бронхиален секрет.

Кога не трябва да се прилага Флавамед® разтвор против кашлица?

Флавамед® разтвор против кашлица не трябва да се прилага при свръхчувствителност към ambroxol hydrochloride или някое от помощните вещества на лекарството (напр. свръхчувствителност към бензоати, непоносимост към някои захари).

Какво трябва да знаете преди да започнете лечението с Флавамед® разтвор против кашлица?

При нарушена бъбречная функция и при тежки чернодробни заболявания, Флавамед® разтвор против кашлица може да се използва само след консултация с лекар (на по-дълги интервали или в по-ниски дози).

При някои редки заболявания на бронхите, съпроводени с голямо натрупване на секрети (т. нар. синдром на неподвижните реснички), Флавамед® разтвор против кашлица трябва да се прилага само под лекарско наблюдение поради риск от застой на секретите.

При деца под 2-годишна възраст, Флавамед® разтвор против кашлица може да се използва само под лекарско наблюдение.

Какви взаимодействия може да има между Флавамед® разтвор против кашлица и други лекарства, които приемате?

При едновременно приложение на Флавамед® разтвор против кашлица с лекарства, които подтикват кашлицата, може да настъпи опасен застой на секрети поради нарушен кашличен рефлекс. Ето защо показанието за едновременното приложение на тези лекарства трябва внимателно да се прецени.



Може ли да се прилага *Флавамед[®]* разтвор против кашлица по време на бременност и кърмене?

Поради липса на достатъчно опит у хора, *Флавамед[®]* разтвор против кашлица може да се прилага при бременност и кърмене само след препоръка от лекар и след внимателна преценка на ползата и риска.

Повлиява ли *Флавамед[®]* разтвор против кашлица способността за шофиране и работа с машини?

Няма специални ограничения.

Как и колко време трябва да се прилага *Флавамед[®]* разтвор против кашлица?

Флавамед[®] разтвор против кашлица се прилага след хранене, с помощта на приложената мерителна лъжичка.

Забележка:

Ефектът на *Флавамед[®]* разтвор против кашлица да втечнява гъстия бронхиален секрет се подобрява от приема на течности. Ето защо, особено по време на лечението, се препоръчва обилен прием на течности.

Продължителността на лечението зависи от вида и тежестта на заболяването.

Флавамед[®] разтвор против кашлица не трябва да се прилага повече от 4-5 дни без консултация с лекар.

Ако не е предписано друго се препоръчва следната доза за *Флавамед[®]* разтвор против кашлица :

Деца до 2 годишна възраст:

По половин мерителна лъжичка с 2.5 ml *Флавамед[®]* разтвор против кашлица два пъти дневно (еквивалентно на 15 mg ambroxol hydrochloride/ден).

Деца между 2-5 години

По половин мерителна лъжичка с 2.5 ml *Флавамед[®]* разтвор против кашлица три пъти дневно (еквивалентно на 22.5 mg ambroxol hydrochloride/ден).

Деца между 6-12 години

По една мерителна лъжичка с 5 ml *Флавамед[®]* разтвор против кашлица два-три пъти дневно (еквивалентно на 30-45 mg ambroxol hydrochloride/ден).

Деца над 12 години

През първите 2-3 дни по две мерителни лъжички с по 5 ml *Флавамед[®]* разтвор против кашлица обикновено три пъти дневно (еквивалентно на 90 mg ambroxol hydrochloride/ден). Лечението продължава с две мерителни лъжички с по 5 ml *Флавамед[®]* разтвор против кашлица обикновено два пъти дневно (еквивалентно на 60 mg ambroxol hydrochloride/ден).


Забележка

При необходимост, при дозиране у възрастни ефективността може да се увеличи чрез приложение на 60 mg ambroxol hydrochloride (четири мерителни лъжички) два пъти дневно (еквивалентно на 120 mg ambroxol hydrochloride/ден).

Какво трябва да се направи в случай на предозиране с *Флавамед[®]* разтвор против кашлица?

След предозиране с ambroxol не са наблюдавани симптоми на интоксикация. Наблюдавани са временно беспокойство и диария.

При приложение на много високи дози може да се наблюдават повищено слюноотделение, гадене, повръщане и понижение на кръвното налягане. В този случай трябва да се консултирате с лекар!



Какви нежелани лекарствени реакции може да причини **Флавамед®**
разтвор против кашлица?

Подобно на всички лекарства, *Флавамед®* разтвор против кашлица може да причини нежелани реакции, които могат да са следните:

Общи нарушения

Нечести ($\geq 0.1\% - < 1\%$): реакции на свръхчувствителност (кожен обрив, оток на лицето, задух, сърбеж), треска.

Много редки (<0.01 %): анафилактические реакции.

Гастро-интестинален тракт

Нечести ($\geq 0.1\% - < 1\%$): гадене, стомашна болка, повръщане.

Съдържанието на сорбитол може да доведе до лек лаксативен (разхлабващ) ефект.

Кожа

Много редки (<0.01 %): тежки кожни реакции, като епидермална некролиза и синдром на Стивънс-Джонсън.

Предпазни мерки

При първите признания за реакции на свръхчувствителност, приложението на **Флавамед®** разтвор против кашлица трябва да се преустанови. Информирайте Вашия лекар, за да прецени тежестта на симптомите и при необходимост да предприеме съответните мерки.

Забележка за диабетици:

Една мерителна лъжичка с 5 ml разтвор съдържа сорбитол 1.75 mg (=0.15 хлебни единици).

Калоричната стойност е 2.6 kcal/g сорбитол.

Как да съхранявате Флавамед® разтвор против кашлица?

Ла се съхранява под 25 °C!

Съхранявайте бутилката в картонената кутия, защитена от светлина.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Срок на годност

3 ГОДИНИ

Срок на годност след първо отваряне на бутилката: 3 месеца.

Да не се използва след срока на годност, обозначен на опаковката!

Дата на последната редакция на листовката

Март, 2005 год.

Притежател на разрешението за употреба

 BERLIN-CHEMIE
(MENARINI GROUP)
Glienicker Weg 125
12489 Berlin, Germany

