

ИАЛ  
ОДОБРЕНОІ  
ДАТА ...10.06.03

## MST UNO ( МСТ УНО)

### Какво трябва да знаете за твърдите капсули MST™ UNO с удължено освобождаване на активната съставка от 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg, 150 mg

Моля, прочетете внимателно листовката преди да започнете вземането на капсулите.

Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за нещо, обърнете се към своя семеен лекар или фармацевт.

Запазете листовката. Може да се наложи да я прочетете отново.

#### Какво съдържат капсулите?

Капсулите съдържат активната съставка Morphine Sulphate BP / Ph Eur (30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg, 150 mg). Морфинът принадлежи към група лекарства, наречени аналгетици или обезболяващи.

Всяка капсула е маркирана с надпис MS OD и посочено количество Морфин Сулфат в нея (30,60,90и т.н.). Капсулите от 30 mg са светлосини, от 60 mg – кафяви, от 90 mg – розови, от 120 mg – маслиненозелени, а от 150 mg – сини.

Капсулите съдържат и следните неактивни съставки:

- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| - Хидрогенирано растително масло | - Полиетилен гликол     |
| - Талк                           | - Магнезиев стеарат     |
| - Желатин                        | - Натриев додецилсулфат |
| - Шелплак                        | - Железен окис (Е172)   |
| - Соев лецитин                   | - Диметилполисилоксан   |

Съответните капсули съдържат и изброените по-долу оцветители:

30 mg: Индиго кармин (Е132) и титаниев диоксид (Е171).

60 mg: Индиго кармин (Е132), титаниев диоксид (Е171) и железен оксид (Е172).

90 mg: Еритрозиново червено (Е127), титаниев диоксид (Е171) и железен оксид (Е172).

120 mg: Индиго кармин (Е132), титаниев диоксид (Е171) и железен оксид (Е172).

150 mg: Еритрозиново червено (127), индиго кармин (Е132), титаниев диоксид (Е171) и железен оксид (Е172).

Във всяка кутия се съдържат 28 капсули.

Капсулите са произведени от Bard Pharmaceuticals Limited, Cambridge Science Park, Cambridge, CB4 OGW, UK за притежателя на разрешението за продажба Mundipharma Medical Company Ltd.

#### Какво е предназначението на капсулите?

Капсулите служат за облекчаване на силна болка.

#### Кой може да приема капсулите?

Капсулите са предписват на възрастни и деца над 1 година.

Преди да вземете капсулите, уведомете своя лекар или фармацевт, ако:

\* сте бременна или кърмите,

\* вземате лекарства против депресия, например моноаминооксидазни



- инхибитори, или ако сте вземали подобен медикамент през последните две седмици,
- \* вземате приспивателни, например намаляващи тревогата сънтворни или седативни средства или ако започвате да ги вземате по време на лечението с капсули MST<sup>TM</sup> UNO,
  - \* сте чувствителни или алергични към морфин,
  - \* вземате лекарства против високо кръвно налягане,
  - \* насоку Ви е бил даван анестетик, който отпуска мускулите,
  - \* вземате симетидин (лекарство против язви, стомашни разстройства и киселини).

Уведомете своя лекар или аптекар също, ако страдате от някое от изброените по-долу заболявания:

- \* Астма,
- \* Хроничен бронхит,
- \* Заболявания на щитовидната жлеза,
- \* Бъбречни заболявания,
- \* Чернодробни заболявания,
- \* Паралитичен илеус (вид чревна непроходимост),
- \* Някакво стомашно заболяване (като забавено изпразване на стомаха или остръ корем),
- \* Конвулсивни заболявания (заболявания, които причиняват припадъци, например, епилепсия),
- \* Повишено вътрешночерепно налягане (силно главоболие, гадене),
- \* Ниско кръвно налягане,
- \* Панкреатит (възпаление на панкреаса),
- \* Адренокортикална недостатъчност (нарушена функция на надбъбречните жлези),
- \* Хипертрофия на простатата (уголемяване на простатната жлеза).

Ако Ви предстои операция, уведомете лекаря в болницата, че приемате тези капсули.

Вземайте капсулите, само ако са предписани лично за Вас. Никога не ги давайте на други хора, дори ако техните симптоми са същите като Вашите.

Не пийте алкохол по време на лечението с тези капсули, не шофирайте и не работете с машини и апаратура, защото ще се чувствате сънливи и няма да можете да се концентрирате.

### Как да вземате капсулите?

На етикета е посочено колко капсули да вземате и на какви интервали от време. Ако не сте сигурни, попитайте своя лекар или аптекар. Не вземайте повече капсули, отколкото е отбелязано на етикета. Погълъщайте капсулите цели, с вода. Ако желаете, можете да отворите капсулата и да поръсите съдържанието й върху мека храна, например кисело мляко. Не мачкайте капсулите и не ги дъвчете.

Вземайте капсулите по едно и също време всяка сутрин. Например, ако вземате капсула в 8 часа сутрин, следващата ще трябва да вземете на другата сутрин в 8 часа. Можете да вземате капсулите преди или след хранене.

### Какво да направите, ако забравите да вземете капсулата?

Ако си спомните за това преди да са изминали 16 часа от последното вземане на



капсула, можете да вземете поредната капсула веднага. Следващата, вземете в обичайното време. Ако сте закъснели с повече от 16 часа, потърсете съвет от своя лекар. Той може да Ви предпише друго обезболяващо средство, което ще действа до времето на вземане на поредната капсула.

**Какво трябва да направите, ако някой случайно изпие капсулите или вземе прекалено много от тях?**

Незабавно се обадете на лекаря си или в местната болница.

**Ще имате ли някакви проблеми?**

Повечето хора получават запек, когато вземат тези капсули. Вашият лекар може да ви предпише слабително, за да преодолеете този проблем. Освен запека, повечето хора обикновено нямат други проблеми докато пият капсулите. Проблемите, които се появяват, обикновено са леки и изчезват след няколко дни.

Може да ви се догади или да повърнете, когато вземате капсулите. Това състояние трябва да премине след няколко дни. Вашият лекар може да ви предпише средство против гаденето, ако то ви създава проблем.

Когато започнете да вземате капсулите или когато увеличите дозата, може да установите, че не успявате да се концентрирате или че се чувствате по-сънливи от обикновено. Това също трябва да премине до няколко дни.

При малко на брой хора може да възникне някое от следните състояния: сухота в устата, изпотяване, световъртеж, главоболие, промени в настроението, неритмична сърдечна дейност, дезориентация (обърканост), зачеряване на лицето, халюцинации, бронхоспазъм (стесняване на дихателните пътища), колики (вид присвиваща болка).

Много рядко уринирането може да бъде затруднено. Рядко пациентите съобщават за понижаване на кръвното налягане и за забавяне на сърдечната дейност. Някои пациенти могат да страдат от алергични реакции като обрив или сърбеж.

Ако имате някакви други проблеми, уведомете своя лекар.

**Колко дълго и къде трябва да съхранявате капсулите?**

На етикета има дата, след която препаратът не бива да се използва. Например, EXP 08.2003 означава, че след края на август 2003 година препаратът е негоден. След посочената дата занесете неизползваните капсули в аптеката.

Съхранявайте капсулите при или под 25°C.  
Съхранявайте ги на недостъпно за деца място.

**Притежател на разрешението за продажба**

Mundipharma Medical Company  
Mundipharma House,  
14 Par-L-Ville,  
Hamilton HMJX,  
Bermuda



**Дата на съставяне на тази листовка:**

Януари 1998

Капсулите MST™ UNO / MXL® са обект на Европейски патенти номера: 94304144.2  
and 94308493.9.

® MXL е регистрирана търговска марка в Обединеното Кралство.

NAPP е регистрирана търговска марка

© Napp Pharmaceuticals Limited, 2001.

