

Уважаеми пациенти, моля прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна информация за лекарственото средство. За консултация се обръщайте към специалист - лекар или аптекар.

АЛМИРИД 20
ALMIRID 20

ИАЛ
ОДОБРЕННОІ
ДАТА 14.03.06г.

Състав: 1 таблетка Алмирид 20 съдържа:

Лекарствено вещество: α -dihydroergocriptine mesylate 20 mg

Помощни вещества: лактозаmonoхидрат, микрокристална целулоза, царевично нишесте, магнезиев стеарат, кроскармелоза натрий, повидон.

Лекарствена форма и опаковка:

Таблетки

Оригинална опаковка с 20 таблетки

Производител:

"Doppel Farmaceutici S.R.L"

Via Volturro 48

Quinto de Stampi

I-2089 Rozzano – Milan, Italy

"ЦСЦ Фармасютиксъл България" ЕООД

ул. "Асен Йорданов" 10, София 1592

Показания:

Третиране на симптомите на влошаване на когнитивните способности и промени в поведението, свързани с психо-органичния сенилен синдром, сенилната деменция или съдовата деменция. Профилактично лечение на главоболие и мигрена. Болест на Паркинсон. Хиперпролактинемия и инхибиция на лактацията.

Противопоказания:

В кои случаи не се прилага Алмирид 20?

При доказана или предполагаема бременност или по време на кърмене, при свръхчувствителност към лекарственото вещество, алкалоиди от житно мораво рогче /Claviceps purpurea/, или другите помощни вещества, съдържащи се в лекарството (вж Състав). Лекарственият продукт не е подходящ за деца. Поради възможните нежелани лекарствени реакции (засилване на ефекта) не се препоръчва едновременното приемане с други алкалоиди /Claviceps purpurea/ (вж Лекарствени и други взаимодействия). Особено внимателно трябва да се подхожда при пациенти с чернодробна недостатъчност, установени психози, както и при хипотоници (с ниско кръвно налягане) или при едновременното приложение с антихипертензивни лекарствени продукти (лекарства за лечение на високо кръвно налягане).

В кои случаи трябва да се посъветвате с лекар, преди да приемате Алмирид 20?

Долу са описани случаите, в които следва да приемате Алмирид 20 само при определени условия и с особено внимание. За консултация обрънете към вашия лекуващ лекар, дори и ако описаните оплаквания са вече отшумели.

При предишни заболявания на черния дроб приложението на Алмирид 20 трябва да се обсъди внимателно с лекуващия лекар.

Какво трябва да имате предвид при бременност или кърмене?

Алмирид 20 не трябва да се прилага при доказана или предполагаема бременност, както и по време на кърмене.



При лечение с лекарствения продукт, продължаващо повече от 6 месеца при дозировки от 60 mg на ден, се препоръчва извършването на прегледи на черния дроб на определени периоди. Тъй като Алмирид 20 намалява агрегацията /съединяването на тромбоцитите и по този начин гъстотата на кръвта/, при пациенти със съответните предразположения трябва да се провеждат по-чести изследвания на кръвта.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

При лечение с лекарствения продукт, продължаващо повече от 6 месеца при дозировки от 60 mg на ден, се препоръчва извършването на прегледи на черния дроб на определени периоди. Тъй като Алмирид 20 намалява агрегацията /съединяването на тромбоцитите и по този начин гъстотата на кръвта/, при пациенти със съответните предразположения трябва да се провеждат по-чести изследвания на кръвта.

a-Dihydroergocriptine се свързва със сънливост, и други агонисти на допамина могат да бъдат свързани с прояви на внезапно настъпила сънливост, особено при пациенти с Паркинсон. Пациентите следва да бъдат информирани за това, и да бъдат посъветвани да внимават при шофиране или работа с машини, когато са подложени на лечение. Пациенти, които са имали прояви на сънливост, трябва да се въздържат да шофират или да работят с машини. В допълнение, при тях може да се помисли за намаляване на дозата или прекратяване на лечението.

Какво трябва да спазвате при шофиране и работа с машини?

Възможно е да се появят нежелани лекарствени реакции като виене на свят, главоболие, нарушена координация, които да намалят зрителната способност, бързината на реакциите и концентрацията. Употребата на Алмирид 20 може да доведе до сериозно намаление на концентрацията на пациента, което има отрицателен ефект при шофиране или работа с машини. Този ефект се увеличава в комбинация с алкохол или седативни средства. Препоръчва се особено в първите дни на прием на лекарството да се избягва шофирането, работата с машини или други подобни дейности. Осигурете си опора по време на работа! Непременно се консултирайте с лекуващия лекар, който ще вземе решение съгласно дозировката и индивидуалните реакции на пациента.

Пациенти, които чувстват умора по време на лечението с Алмирид 20, не бива да шофират и да работят с машини поради опасност от нараняване.

Лекарствени и други взаимодействия:

Кои други лекарствени продукти повлияват въздействието на Алмирид 20?

Какво е въздействието на Алмирид 20 върху други лекарствени продукти?

Изследванията за лекарствените взаимодействия на Алмирид 20 и Леводопа при болни от болестта на Паркинсон показваха, че не се наблюдава клиничен ефект на лекарственото вещество *a*-dihydroergocriptine mesylate върху Леводопа. При едновременно приложение с Леводопа са възможни оплаквания от болки в стомаха, хипотензия и главоболие. Не е изключена и появата на отоци.

Алмирид 20 не трябва да се приема едновременно с други алкалоиди на основа на житно мораво рогче (съществува опасност от адитивен ефект, ерготизъм/отравяне с житна ръжда/). Въздействието на хипертензивните лекарствени продукти (лекарства за повишаване на кръвното налягане) може да бъде намалено, за сметка на това въздействието на хипотензивните (лекарствени продукти за хипертоници) може да бъде увеличено. Едновременното приемане с нитропрепарати (лекарствени продукти, които се прилагат при опасност от сърдечен инфаркт) може евентуално да засили ефекта на Алмирид 20. Не е изключено Алмирид 20 да засили въздействието на седативните лекарства и хипнотиците. Алмирид 20 възпрепятства агрегацията на тромбоцитите, намалява вискозитета на кръвта и пречи на съединяването.



Макролидните антибиотиците (специална група антибиотици) не бива да се приемат заедно с Алмирид 20 поради възможното въздействие върху съдържанието на кръвта. В случаите, когато пациентът заедно с Алмирид 20 приема и дигоксин (лекарство за пациенти със сърдечни оплаквания) не е необходима промяна на дозировката на дигоксина. Направените изследвания показваха, че лекарственото вещество, *α-dihydroergocriptine mesylate*, не оказва клинично въздействие върху дигоксина. Не забравяйте, че посочените лекарствени и други взаимодействия могат да се отнасят и за лекарства, които пациентът е приемал доскоро.

Какви храни и напитки трябва да избягват пациентите, приемащи Алмирид 20?
Не е изследвано взаимодействието между алкохола и Алмирид 20. Във всеки случай трябва да се избяга употребата на алкохол, защото е възможно той да повлияе отрицателно върху поносимостта към лекарствения продукт. Пациентите следва да избягват тежки храни, както и храни, които не им понасят добре.

Начин на приложение и дозировка:

Дозировката на Алмирид 20 зависи от стадия на заболяването, като приложението на лекарството е различно при всеки един пациент.

Спазвайте следната дозировка, освен ако лекуващият лекар не ви е предписал друга.

1-14 дни 1-2 седмици	капсула 5 mg		капсула 5 mg
15-28 дни 3-4 седмици	половин таблетка 20 mg		половин таблетка 20 mg
29-42 дни 5-6 седмици	половин таблетка 20 mg	половин таблетка 20 mg	половин таблетка 20 mg
43-56 дни 7-8 седмици	таблетка 20 mg		таблетка 20 mg
57-70 дни 9-10 седмици	таблетка 20 mg	половин таблетка 20 mg	таблетка 20 mg
71-84 дни 11-12 седмици	таблетка 20 mg	таблетка 20 mg	таблетка 20 mg
Продължително лечебие (максимална дневна доза)	2 таблетки x 20 mg	2 таблетки x 20 mg	2 таблетки x 20 mg

Много е важно да спазвате стриктно начина на приложение и дозировка. В противен случай действието на лекарството не е гарантирано!

Колко таблетки и колко често трябва да приемате Алмирид 20?

Алмирид 20 (всяка таблетка, от който съдържа 20 mg лекарствено вещество) е особено подходящ при висока дозировка и при напредната фаза на лечение на болестта на Паркинсон. Таблетките могат да се разделят на части (виж фиг.). За началната фаза на лечение на Паркинсонова болест се препоръчва използването на Алмирид 20. Обикновено лекуващият лекар определя по своя преценка дозировката на Алмирид 20, така че да се постигне максимален терапевтичен ефект при най-подходяща за пациента дозировка.

Ако лекуващият лекар не е предписал друго, да се спазва следната схема на дозировка при самостоятелно приложение (монотерапия) на Алмирид 20.
Започва се с приемането на 1/2 таблетка от лекарствения продукт 2 пъти дневно, сутрин и вечер (дневна доза = 10 mg). След 2 седмици дозата се увеличава на по 1/2



таблетка 2 пъти дневно, сутрин и вечер (дневна доза = 20 mg). След още 2 седмици дозата се увеличава на 1 таблетка 2 пъти дневно, сутрин и вечер (дневна доза = 40 mg). Дневната доза се увеличава на всеки 2 седмици със съответно 1 таблетка (= 20 mg активно вещество), докато се достигне необходимата за постигането на терапевтичен ефект доза. При самостоятелно приложение (монотерапия) на Алмирид 20 тази доза е равна на 30-120 mg активно вещество на ден.

Дозировка на Алмирид 20 при едновременно приложение с Леводопа:

Започва се с приемането на по 1/2 таблетка 2 пъти дневно, сутрин и вечер (дневна доза = 10 mg). След 2 седмици дозата се увеличава на по 1/2 таблетка 2 пъти дневно, сутрин и вечер (дневна доза = 20 mg). След още 2 седмици дозата се увеличава на 3/4 таблетка 2 пъти дневно, сутрин и вечер, или 3 пъти дневно по 1/2 таблетка – сутрин, обед и вечер (дневна доза = 30 mg). Дневната доза се увеличава на всеки 2 седмици със съответно 1/2 таблетка (= 10 mg лекарствено вещество), докато се достигне необходимата за постигането на терапевтичен ефект доза. Тази доза е обикновено около 60 mg лекарствено вещество на ден, разпределено в 1 таблетка сутрин, обед и вечер. При някои пациенти може да е необходима дозировка до 120 mg лекарствено вещество на ден, съответно по 40 mg сутрин, обед и вечер.

Намаляването на дозировката на Леводопа трябва да става постепенно, докато се постигне максимален терапевтичен ефект.

Възможно е наблюдаваните промени в кръвната картина на пациента да са свързани с бъбречна или чернодробна недостатъчност. При такива пациенти увеличаването на дозировката трябва да става особено внимателно.

Кога и как се приема Алмирид 20?

Дневната доза трябва да се приема два пъти дневно, като половината доза се приема сутрин, а другата половина вечер (намалена дозировка). При увеличаване на дозировката лекарственият продукт се приема 3 пъти на ден на равни дози (увеличена дозировка).

Таблетките се приемат цели по време на ядене или малко след ядене с течност (най-добре с вода).

Колко време се приема Алмирид 20?

Лекуващият лекар определя продължителността на лечението с Алмирид 20. Обикновено лекарството се приема за продължителен период от време, няколко седмици или месеца, дори и няколко години.

Предозиране:

Какво да предприемем, ако сме предозирали Алмирид 20?

При предозиране на лекарствения продукт са възможни различни оплаквания като смущения на зренietо, чувство на страх, нервно възбуждение, виене на свят, конвулсии, смущения на сърдечния ритъм като забавяне или ускоряване до сърдечносъдов колапс. При предозиране незабавно се консултирайте с лекар, който ще предприеме необходимите мерки (напр. стомашна промивка). В зависимост от състоянието на кръвоносните съдове на пациента е възможна появата на спазми и повишаване на кръвното налягане, както и чувство на студ. Възможно е загърътане на ушите, както и болки в крайниците. При предозиране на лекарствения продукт се прилага симптоматична терапия и поддържащи мерки. При пациента трябва да се предизвика повръщане или да му се даде очистително средство. Освен това трябва да се приложи и активен въглен за прочистване на организма. За целта могат да се използват и допамин-антагонисти като напр. суплирид или метоклопрамид парентерално. При симптоматична хипотензия се препоръчват индиректни симпатомиметици или директни а-симпатомиметици и ангиотензин II при спазми на кръвоносните съдове се препоръчват следните лекарства – продукти с калциеви антагонисти, нитросъединения, папаверин, теофилин.



Какво следва да направите, ако сте забравили да приемете дозата си Алмирид 20 или еднократно сте приели по-малка или съответно по-голяма доза?

Ако веднъж сте взели една таблетка в повече или по-малко, или сте забравили да вземете една доза, продължете с приемането на Алмирид 20 по предписанията на лекуващия ви лекар. Ако сте забравили да приемете дозата си няколко пъти или сте приели неправилна доза от лекарствения продукт, продължете да го вземате съгласно предписанията на лекуващия ви лекар. Консултирайте се с него дали се налага да промените дозировката и продължителността на приемане на лекарството и как да го направите. Ако имате колебания, непременно се обърнете към специалист!

Какво трябва да имате предвид, ако искате да прекъснете или прекратите лечението с Алмирид 20?

Ако желаете да прекъснете или прекратите лечението с лекарствения продукт поради появили се неприятни или нетърпими нежелани лекарствени реакции, непременно се обърнете към лекуващия си лекар за съвет. В много случаи промяната на дозировката към индивидуалните нужди на пациента подобрява поносимостта към лекарството. Възможно е постигане на желания терапевтичен ефект да стане чрез предписането на друг лекарствен продукт или преминаването към самостоятелно или комбинирано приложение.

Нежелани лекарствени реакции:

Какви нежелани лекарствени реакции могат да се наблюдават по време на лечението с Алмирид 20?

По време на клиничните изследвания, особено в първите дни на приложението на лекарствения продукт, се проявиха следните нежелани лекарствени реакции:

Много често (при над около 10%): гадене и болки в стомаха

Често (между 1% - 10%): виене на свят, главоболие, сънливост, повръщане, киселини, болки в стомаха, понижено кръвно налягане (понижаване с до 5 mm Hg), ортостатични проблеми с кръвообращението, ускорена сърдечна дейност, ускорен пулс, нервност, отоци, депресия, безсъние, зачервяване на кожата, кожни обриви, промяна на теглото и сухота в устата.

В някои случаи (при по-малко от 1%): общо неразположение, нервност, възбуда, чувство на страх, безчувственост, изтръпване на краката и ръцете, студени крайници, запушване на носа, загуба на либидото, нарушенна координация на движенията, виене на свят, мускулни болки, засилена функция на потните жлези, треперене, загуба на апетит, шум в ушите, сърдечни оплаквания, запек, съновидения, халюцинации.

Гореописаните нежелани лекарствени реакции могат да бъдат намалени при намаление на дозата.

При дълготрайно лечение с лекарства, съдържащи вещества, извлечени от алкалоиди от житно мораво рогче поради Claviceps purpurea, в много редки случаи се наблюдават белодробни промени (плевроизливи, плевропулмунални фибрози), които се изразяват под формата на задъхване и дразнеща кашлица. Не е установена взаимовръзка между Алмирид 20 и наблюдаваните нежелани лекарствен реакции.

При появя на нежелани лекарствени реакции информирайте лекуващия си лекар, който ще вземе съответните мерки.

Ако при вас се наблюдават нежелани лекарствени реакции, които не са описани в тази листовка, обърнете се към лекар или аптекар за консултация.

Срок на годност на лекарствения продукт:

Срокът на годност на този лекарствен продукт е отбелаязан върху външната част на опаковката, както и на блистера. Не приемайте лекарства с изтекъл срок на годност!

Актуалност на информацията от листовката: август 2003 година



Съхранение: Съхранявайте Алмирид 20 на място, недостъпно за деца.

Номер на разрешителното: 20000166

Лекарства със сходно действие: Алмирид 5, опаковки с по 30 капсули

