

ИАЛ

ОДОБРено!  
дата 28.02.06г.

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА  
**PROVERA®**  
**ПРОВЕРА**  
(Medroxyprogesterone acetate)

Моля, прочетете тази листовка внимателно преди да започнете да вземате таблетките. Ако имате никакви въпроси или не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

**Какво представлява ПРОВЕРА?**

Наименованието на Вашето лекарство е ПРОВЕРА. Лекарственото вещество е medroxyprogesterone acetate (медроксипрогестерон ацетат). Всяка таблетка съдържа 5 mg от лекарственото вещество.

ПРОВЕРА съдържа също и няколко помощни вещества: лактоза, царевично нишесте, захароза, течен парафин, калциев стеарат и талк. Вашата опаковка съдържа 24 таблетки.

**Какво е действието на ПРОВЕРА?**

ПРОВЕРА е прогестаген (хормонален продукт), получен от прогестерон (женски полов хормон), който влияе върху нивата на различни хормони в кръвта. Лекарството има влияние и върху лигавицата на матката.

**Притежател на разрешението за употреба**

PFIZER EUROPE MA EEC, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, England CT13 9NJ

**Производител**

Pharmacia Italia S.p.A. Via del Commercio, 63046 Località Marino del Tronto, Ascoli Piceno (AP), Italy

**За какво се използва ПРОВЕРА?**

Вашите таблетки могат да бъдат използвани за:

Лечение на ендометриоза (заболяване на женските полови органи, проявяващо се най-често с болезнена менструация).

Лечение на вазомоторни симптоми при менопауза („горещи вълни“ и др.)

Диагностициране на първична аменорея (липса на менструация).

Диагностициране и лечение на вторична аменорея (спиране на менструацията при жени, които са имали менструация).

Лечение на дисфункционално (неменструално) маточно кървене

Противодействие на ефектите на естрогена върху лигавицата на матката при жени в менопауза, лекувани с естроген (хормоно-заместителна терапия [ХЗТ])

Вашият лекар ще може да приложи ПРОВЕРА за лечение на състояния, различни от тези изброени по-горе. Попитайте Вашия лекар, ако не сте сигурни за причината, поради която той Ви го е предписал.

**Подходящ ли е ПРОВЕРА във Вашия случай?**

Вашият лекар ще Ви зададе въпроси преди да Ви предпише тези таблетки, за да се увери, че това лекарство е подходящо за Вас. Ако не разбираете някой от зададените въпроси, помолете лекаря да Ви го обясни.

Не трябва да вземате това лекарство, ако:

- сте алергични към ПРОВЕРА или някое от помощните вещества;
- сте бременна, предполагате, че сте бременна или планирате да забременеете.;
- имате неизяснено вагинално кървене;
- имате сериозно нарушена чернодробна функция;

имате или се подозира, че имате рак на гърдата.

Посъветвайте се с Вашия лекар, ако страдате или сте страдали от някое от следните заболявания:

- тромбофлебит (възпаление на вените) или тромбоемболизъм (затушване на кръвоносен съд от съсирек);
- заболяване, съпроводено със задръжка на течности;
- депресия;



- захарен диабет.

Съобщете на Вашия лекар, ако някое от гореспоменатите се отнася за Вас. Вашият лекар ще реши дали лечението с ПРОВЕРА е подходящо за Вас.

В случай на неочаквано кървене от влагалището по време на лечението с ПРОВЕРА незабавно уведомете Вашия лекар.

Съобщете незабавно на Вашия лекар, ако получите внезапно частична или загуба на зрението, двойно виждане, мигrena, оток, болка и/или зачеряване по хода на вените.

Ако трябва да Ви бъдат направени някакви изследвания, съобщете на лекаря или лаборанта, който прави изследванията, че приемате ПРОВЕРА.

Съобщете незабавно на Вашия лекар, ако получите кожен обрив, отоци по лицето и тялото, свиркащо дишане или хривове по време на лечението с ПРОВЕРА.

#### **Може ли ПРОВЕРА да се използва по време на бременност или кърмене?**

Използването на ПРОВЕРА по време на бременност не се препоръчва. Ако кърмите, посъветвайте се с Вашия лекар преди да приемате някакви лекарства, включително ПРОВЕРА.

#### **Приемате ли други лекарствени продукти?**

ПРОВЕРА може да взаимодейства с някои лекарства. Съобщете на Вашия лекар, ако приемате други лекарства преди започване на лечението с ПРОВЕРА, включително и лекарства, които сте си купили сами. Преди да приемете някое ново лекарство, съобщете на Вашия лекар за всички лекарства, които вече вземате. Ако смятате, че докато вземате Вашите таблетки, може да се наложи сами да си купите някое лекарство от аптеката, попитайте Вашия лекар дали има някакви лекарства, които трябва да избягвате, а също така съобщете на фармацевта за това, че приемате ПРОВЕРА, преди да купите някакво лекарство.

Непременно съобщете на Вашия лекар, ако приемате лекарството аминоглутетимид (използува се за лечение на някои ракови заболявания).

Ако не сте сигурни дали някое от лекарствата, които приемате, взаимодейства с ПРОВЕРА, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Ако посетите Вашия лекар по повод на друг медицински проблем, напомните му (й), че вземате ПРОВЕРА.

#### **Как се прилага ПРОВЕРА?**

Вашият лекар ще реши каква доза трябва да получавате. Дозата и продължителността на лечението зависят от Вашето заболяване и неговата тежест. Винаги вземайте Вашите таблетки точно по начина, по който лекарят Ви ги е назначил. Вашият лекар ще определи кога да спрете да приемате лекарството.

Поглъщайте таблетките цели. Изпийте ги с вода, ако това ще ви помогне да ги прегълтнете.

#### **Приложение при деца**

Вашият лекар ще определи каква доза и колко време да се приема лекарството.

#### **Как да постъпите при прием на по-голямо количество от лекарството?**

Ако приемете по-голямо количество таблетки, незабавно потърсете лекарска помощ.

#### **Какво трябва да направите, ако сте процуснали да вземете Вашите таблетки?**

Ако закъснението е в рамките на няколко часа, вземете Вашата доза веднага щом се сетите за това. Ако закъснението е с един ден или повече, веднага съобщете на Вашия лекар. Ако не можете да се свържете с Вашия лекар, вземете Вашите таблетки както обикновено, докато получите медицинска консултация. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

#### **Води ли ПРОВЕРА до нежелани лекарствени реакции?**

Както всички лекарства, ПРОВЕРА може да причини нежелани реакции. Вашият лекар ще прецени внимателно риска от нежелани лекарствени реакции спрямо ползата от лечението преди да назначи това лекарство. Описвани са следните нежелани реакции (не са подредени по тежест и по честота): алергични реакции, тромбоемболични нарушения (запушване на кръвоносен съд от съсирак), нервност, безсъние, сънливост, умора, депресия (потиснато настроение), замайване, главоболие; жълтеница, гадене; уртикария (алергичен обрив), сърбеж, обрив, акне, хирзутизъм (повишено окосмяване при жените), алопеция (опадане на косата); неправилно маточно кървене, зацепване, аменорея (липса на менструация), ерозии (ранник) на шийката на матката, продължителна ановулация (липса на отделяне на яйцеклетка), напрежение в гърдите, галакторея (отделяне на мляко от млечните жлези, несвързано с



кърмене); повищена температура, промени в телесното тегло, отоци, променени резултати от лабораторни изследвания.

Ако някоя от тези нежелани реакции се окаже трайна или обезпокоителна, или ако забележите нежелана реакция, която не е спомената в тази листовка, моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

**Влияе ли ПРОВЕРА върху способността за шофиране и работа с машини**

Няма данни за ефекта върху способността за шофиране и работа с машини.

**Как се съхранява ПРОВЕРА?**

- Не използвайте лекарството след датата на годност, отбелязана върху опаковката.
- Пазете лекарството на място, недостъпно за деца.
- Съхранявайте лекарството при температура под 25°C (на хладно място).

**ЗАПОМНЕТЕ:** Тези таблетки са предписани лично на Вас. Никога не ги давайте на други хора. Те могат да им навредят, даже и ако техните симптоми са същите като Вашите.

Дата на последната редакция на листовката:

