



ANTISTRUMIN® tabl.coat. 0.5 mg, 1 mg

Информация за пациента

Моля, прочетете внимателно тази листовка преди да започнете лечение. Тя съдържа кратка информация относно Вашето лекарство. Ако не разбирате нещо или имате допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекуващ лекар. Запазете я, защото може да се наложи да я прочетете отново. Това лекарство е предписано лично на Вас и не трябва да го давате на други. То може да им навреди, дори ако симптомите им са същите като Вашите.

ANTISTRUMIN® АНТИСТРУМИН® обвити таблетки 0,5 mg; 1 mg

КАКВО СЪДЪРЖА АНТИСТРУМИН?

Лекарствено вещество: potassium iodide 0.5 mg или 1 mg в една таблетка.

Помощни вещества: натриев тиосулфат, калиев карбонат, захароза, пшенично нишесте, талк, стеарин, еудражит Е 100, твин 80, арабска гума, желатина, титанов диоксид, макрогол 6000, оцветители Е 110, Е 211 (за таблетките от 1 mg) и Е 110, Е 122, Е 211 (за таблетките от 0.5 mg), глицерол.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА

Таблетки по 0,5 mg: по 20 броя в блистер от PVC/алуминиево фолио, по 1 блистер в картонена кутия, заедно с листовка.

Таблетки по 1 mg: - по 20 броя в блистер от PVC/алуминиево фолио, по 1 блистер или по 1000 броя таблетки в пластмасова банка, в картонена кутия, заедно с листовка.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА И ПРОИЗВОДИТЕЛ СОФАРМА АД

София 1220, ул. "Илиенско шосе" 16, България

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АНТИСТРУМИН?

Антиструмин съдържа лекарственото вещество калиев йодид, което е източник на лесно усвоим от щитовидната жлеза йод. Той е необходим за нормалното функциониране на щитовидната жлеза. При недостиг на йод в храната и водата калиев йодит възстановява необходимото количество йод в организма и нормализира нарушената синтеза на хормони на щитовидната жлеза.

ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА АНТИСТРУМИН?

За профилактика на заболявания на щитовидната жлеза, свързани с йоден недоимък (ендемична гуша).

КОГА НЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ АНТИСТРУМИН?

- Свръхчувствителност към лекарственото или някое от помощните вещества;



- Тиреоидит на Хашимото;
- Автономни нодозни струми (възлеста гуша);
- Хипертиреозидизъм (увеличена функция на щитовидната жлеза) в различните му форми.

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ЛЕЧЕНИЕ С АНТИСТРУМИН

Уведомете лекуващия си лекар, ако имате някакво хронично заболяване, ако сте свръхчувствителни към други лекарства или храни или ако вземате други лекарства.

Калиев йодид трябва да се прилага с внимание при: сърдечна недостатъчност (слабост на сърдечния мускул), хиперкалиемия (повишено съдържание на калий в кръвта), туберкулоза.

Бременност и кърмене

Уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете. Преди да вземате някакво лекарство по време на бременност, непременно се консултирайте с лекуващия си лекар.

Калиев йодид преминава през плацентата и при бременност се прилага само в дози, покриващи физиологичните дневни нужди (100 – 200 mcg дневно). При приложение в по-високи дози съществува риск от потискане функциите на щитовидната жлеза на плода.

Калиев йодид се екскретира в кърмата, поради което при кърмене е възможна поява на обриви и понижаване на функцията на щитовидната жлеза у новороденото. По време на бременност или кърмене калиев йодид трябва да се прилага само при доказан йоден недоимък, когато очакваната полза надвишава потенциалния риск за плода или новороденото.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Антиструмин не оказва неблагоприятно влияние върху вниманието и двигателните реакции.

Информация за помощните вещества


В състава на таблетката се намира пшенично нишесте, което може да бъде неподходящо за хора с непоносимост към глутен (глутенова ентеропатия).

Поради наличието на захароза в състава, лекарственият продукт може да бъде неподходящ за хора с нарушено усвояване на захари.

КАКВИ ЛЕКАРСТВА МОЖЕ ДА ВЗАИМОДЕЙСТВАТ С АНТИСТРУМИН?

Моля, уведомете лекуващия си лекар за ВСИЧКИ лекарства, които вземате в момента или сте вземали доскоро, независимо дали са предписани от лекар или сте ги купили без рецепта.

Няма данни за клинично значими лекарствени взаимодействия при прилагането на продукта в профилактични дози.



ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Дозата и продължителността на лечение се определят от лекуващия Ви лекар. Важно е да вземате лекарството така, както лекарят Ви го е предписал. Не трябва да променяте дозите или да преустановявате лечението, без да се консултирате преди това с лекаря, дори ако се чувствате добре. Опитайте се да вземате лекарството по едно и също време всеки ден.

Таблетките се приемат след хранене, с вода.

Възрастни и деца над 7 годишна възраст - по 1 mg веднъж седмично.

Деца от 3 до 7 годишна възраст - по 0,5 mg веднъж седмично.

Деца от 1 до 3 годишна възраст - по 0,5 mg през 15 дни.

Ако вземете повече Антиструмин отколкото трябва

Ако сте приели доза многократно по-голяма от предписаната се посъветвайте незабавно с лекуващия си лекар.

СЪХРАНЕНИЕ

На сухо и защитено от светлина място, при температура под 25°C.

Съхранявайте таблетките в оригиналната опаковка.

Лекарството не трябва да се използва след датата на изтичане на срока на годност, отбелязана върху опаковката.

Съхранявайте лекарството на сигурно място, където децата не могат да го видят и достигнат.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

По лекарско предписание.

Тази листовка е редактирана за последен път на 01.06.2005 г.

