


Информация за пациента

Ambroxol AL 30  
Амброксол АЛ 30



Скъпи пациенти,

Моля, прочетете внимателно настоящето указание за употреба, тъй като то съдържа важна информация относно това, какво трябва да съблюдавате при приложението на лекарствения продукт. Ако имате въпроси, моля обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Ambroxol AL 30  
Амброксол АЛ 30

**Лекарствено вещество:** Ambroxol (под формата на Ambroxol hydrochloride)

**Състав**

1 таблетка съдържа:

Лекарствено вещество: Ambroxol hydrochloride 30 mg

Помощни вещества: микрокристална целулоза, кросповидон, лактоза монохидрат, магнезиев стеарат, царевично нишесте, повидон, силиконов диоксидхидрат, разтворимо нишесте (Microcrystalline cellulose, Crospovidone, Lactose monohydrate, Magnesium stearate, Maize starch, Povidone, Silicon dioxide hydrate, Soluble starch)

**Представяне и големина на опаковката:**

Оригинална опаковка с 20 таблетки

Оригинална опаковка с 50 таблетки

Оригинална опаковка със 100 таблетки

Секретолитично при заболявания на дихателните пътища, придружени с гъсти секрети (експекторанс).

ALIUD<sup>®</sup> PHARMA GmbH & Co.KG  
Gottlieb-Daimler-Str. 19, D-89150 Laichingen, Germany  
Internet: <http://www.aliud.de>; e-mail: [info@aliud.de](mailto:info@aliud.de)

**Показания:**

Муколитично лечение при остри и обострени хронични заболявания на бронхите и белия дроб, придружени с гъсти секрети.

Действащото вещество Ambroxol hydrochloride не трябва да се използва при деца под 2 години или по изключение само под лекарски контрол.

**Противопоказания:**

**Кога не трябва да приемате Ambroxol AL 30?**

Вие не трябва да използвате Ambroxol AL 30 при наличие на свръхчувствителност към действащото вещество амброксол хидрохлорид или към някоя от съставките на лекарството.

### **Кога може да приемате Ambroxol AL 30 само след консултация с Вашия лекар?**

*Ambroxol AL 30 трябва да се използва с особена предпазливост и повишено внимание при по-долу изброените условия. Обсъдете с лекуващия лекар, ако някои от тези условия са се появявали по-рано при Вас.*

Ако Вие имате отклонения в бъбречната функция или тежки чернодробни заболявания, Ambroxol AL 30 може да се прилага само с особено внимание (напр. през удължени интервали или намалени дози).

Амброксол трябва да се прилага с внимание, под лекарски контрол при пациенти със смущения в механизма на отхрачването и анормална продукция на бронхиален секрет (напр. при рядко срещания малигнен цилиарен синдром) поради риск от конгестия на бронхиалната секреция.

### **Какво трябва да съблюдавате по време на бременност и кърмене?**

По време на бременност, особено в първото тримесечие и по време на кърмене, Ambroxol AL 30 трябва да се използва само след внимателна преценка полза/риск, т.к. до момента липсва достатъчен опит при тези случаи.

### **Какво трябва да се има предвид при деца?**

Ambroxol AL 30 не е подходящ за деца под 6 години поради високото съдържание на действащото вещество. За деца под 6 години е подходящо да се прилага течната лекарствена форма, която е с намалено съдържание на действащо вещество.

### **Предпазни мерки при употреба и предупреждения:**

**Какво трябва да имате предвид при шофиране, при работа с машини или при работа без сигурна опора?**

Няма специални изисквания, които да се имат предвид.

### **Лекарствени взаимодействия:**

**За кои други лекарствени продукти е известно, че повлияват върху ефекта на Ambroxol AL 30?**

Едновременното приемане на Ambroxol AL 30 с други противокашлични (антитусивни) средства може да предизвика опасна конгестия на бронхиална секреция чрез инхибиране на откашличния рефлекс. По тази причина комбинираното лечение трябва да е особено внимателно.

**За кои други лекарствени продукти е известно, че се повлияват от Ambroxol AL 30?**

Едновременното използване на Амброксол АЛ 30 с антибактериални лекарства (амоксцилин, цефуроксим, еритромицин, доксициклин) може да увеличи пенетрацията на тези антибиотици в белодробната тъкан.

*Моля, имайте предвид, че тези предпазни мерки важат и за лекарствени продукти, спрени малко преди началото на терапията с лекарството.*

### **Дозирание и приложение, продължителност на терапията**

*Тези инструкции важат само ако Вашият лекар не е предписал друго по отношение на лекарството Ambroxol AL 30. Моля, спазвайте указанията за приложение за ефективно и безопасно лечение с Ambroxol AL 30.*

**Какво количество таблетки Ambroxol AL 30 трябва да приемате и колко често трябва да прилагате лекарството ?**

*Деца 6-12 години*

Дозирането е 1/2 таблетка Амброксол АЛ 30 2-3 пъти дневно (еквивалентна на 15 mg Ambroxol hydrochloride 2-3 пъти дневно).

*Възрастни и деца над 12 години*

Обикновено дозата е 1 таблетка Амброксол АЛ 30 - 3 пъти дневно (еквивалентна на 30 mg Ambroxol hydrochloride 3 пъти дневно) през първите 2-3 дни, а след това по 1 таблетка Амброксол АЛ 30 - два пъти дневно (еквивалентна на 30 mg Ambroxol hydrochloride два пъти дневно).

*Забележка:*

Ако Вие имате отклонения в бъбречната функция или тежки чернодробни заболявания, Ambroxol AL 30 може да се прилага само през удължени интервали или намалени дози.

**Как и кога трябва да прилагате Ambroxol AL 30?**

Таблетките Ambroxol AL 30 са делими.

Таблетките Ambroxol AL 30 се приемат след храна, без да се дъвчат, с достатъчно количество течност.

*Забележка:*

Секретолитичното действие на Ambroxol AL 30 се усилва от приема на течности.

**Колко дълго можете да прилагате Ambroxol AL 30?**

Продължителността на лечението се определя от вида и тежестта на заболяването, по преценка на лекуващия лекар.

Ambroxol AL 30 не трябва да се прилага повече от 4-5 дни, освен ако лекуващият лекар не е предписал друго.

*Предозиране и грешки при приложението*

**Какво трябва да направите в случай, че сте приложили твърде голямо количество от Ambroxol AL 30 (нарочно или случайно предозиране на продукта)?**

Симптоми или признаци на отравяне не са наблюдавани при предозиране на Ambroxol. Съществуват съобщения за преминаващи безпокойство и диария.

В случай на екстремно предозиране може да се наблюдава повишено слюноотделяне, гадене, повръщане и понижаване на кръвното налягане.

Свържете се с лекуващия лекар.

Спешни мерки като предизвикване на повръщане и стомашна промивка не са специално необходими и трябва да се предприемат само в случаи на екстремно предозиране. Лечението трябва да е в съответствие със степента и признаците на предозиране.

**Какво трябва да направите в случай, че сте приложили твърде малко количество от Ambroxol AL 30 или сте пропуснали прием?**

Ако сте пропуснали прием или сте приели по-малко от предписаната доза, продължете лечението с Ambroxol AL 30, както е описано в инструкциите на дозиране.

### **Нежелани лекарствени реакции**

**Какви нежелани лекарствени реакции могат да се проявят при приложението на Ambroxol AL 30?**

Съществуват редки съобщения за: стомашно-чревни симптоми (гадене, стомашна болка), реакции на свръхчувствителност (алергични реакции) по кожата и лигавиците (напр. подуване, кожни обриви, зачервяване, сърбеж), задух, зачервяване на лицето, повишена температура с тръпки.

Прилагането на Амброксол в редки случаи може да се свърже с появата на сухота в устата и дихателните пътища, увеличена саливация (слюноотделяне), увеличена секреция от носа, запек и затруднение в уринирането.

В единични случаи се съобщава за алергични кожни възпаления (контактни дерматити).

*Ако при Вас се срещнат нежелани странични ефекти, които не са описани в настоящото указание за употреба, моля съобщете това на лекуващия лекар или фармацевт.*

### **Какви мерки трябва да предприемете при нежелани лекарствени реакции ?**

При първите симптоми на реакции на свръхчувствителност спрете приемането на Ambroxol AL 30. Информирайте лекуващия лекар, който да прецени степента и необходимите мерки, които трябва да се предприемат.

### **Годност и стабилност на лекарствения продукт:**

Датата на изтичане на срока на годност е отпечатана на блистера и на картонената опаковка.

Не използвайте продукта след тази дата!

Да се пази от светлина! Да се съхранява под 25° C!

### **Изготвяне на информацията**

Октомври 1998

**Да се съхранява на място, недостъпно за деца!**

### **Други форми и размери на опаковките**

**Ambroxol AL 75 retard Амброксол АЛ 75 капсули с удължено действие**

Оригинална опаковка от 20 капсули с удължено действие

Оригинална опаковка от 50 капсули с удължено действие

### **Ambroxol AL Saft Амброксол АЛ сироп**

Оригинална опаковка от 100 ml сироп

Оригинална опаковка от 250 ml сироп

### **Ambroxol AL Tropfen Амброксол АЛ капки**

Оригинална опаковка от 50 ml капки перорални, разтвор

Оригинална опаковка от 100 ml капки перорални, разтвор

Рег. №