



ФАМВИР / FAMVIR®

ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ 250 mg

Информация за пациента

Автор:

Dr. Qiaoqian Luthi-Peng

Вид документ:

Листовка / информация за пациента

Дата на последната редакция:

04 юни 2003, промяна 05 април 2005

Дата на публикуване

19 май 2005

Брой страници:

6



Преди да започнете лечение с Фамвир, прочетете внимателно цялата информация, съдържаща се в тази листовка.

- Запазете листовката. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не бива да го препоръчвате на други хора и не бива да го използвате за лечение на други заболявания.
- Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка

1. Какво представлява Фамвир и за какво се използва?
2. Преди да започнете да употребявате Фамвир
3. Как да използвате Фамвир?
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Фамвир
6. Допълнителна информация

ИАЛ
ОДОБРЕННО!
ДАТА 09.05.06г.

Фамвир / Famvir® филмирани таблетки 250 mg

- Лекарственото вещество на Фамвир е фамцикловир (famciclovir).
- Помощните вещества са: безводна лактоза, натриево нишестен гликолат, хидропропилцелулоза, магнезиев стеарат; таблетната обвивка е съставена от: хипромелоза, титанов диоксид (E171) и пропилен гликол.

Притежател на разрешението за употреба:

Novartis Pharma Services Inc.,
Lichtstrasse 35,
CH 4056 Basel
Switzerland

Производител:

Novartis Pharmaceutica S.A.
Ronda Santa Maria 160
Barbera
08210 Barbera del Valles
Spain



1. Какво е Фамвир и за какво се използва?

Фамвир е противовирусно лекарство, използвано за лечение на херпес зостер. Херпес зостер е инфекция, причинена от вирус, наречен варицела зостер. Фамвир предотвратява разпространението на вируса и намалява болезнените обриви и мехури.

Фамвир се прилага за лечение на остри и повторни епизоди на херпес зостер при възрастни. Гениталният херпес е вирусна инфекция, причинена от вирус, наречен херпес симплекс 1 или 2, който обикновено се предава при полов контакт. Причинява мехури с усещане за парене и сърбежи в областта на гениталиите, които може да бъдат и болезнени. Хората, които имат чести епизоди на генитален херпес може да се лекуват с Фамвир, с цел предотвратяване на следващи епизоди. Въпреки, че Фамвир не лекува вирусната инфекция, той подпомага облекчаването на симптомите и скъсява тяхната продължителност. Приемането на Фамвир не Ви предпазва от предаване на херпес вирус на друг човек.

Най-добри резултати в лечението на херпес зостер и генитален херпес се постигат, ако лекарството започне да се приема колкото се може по-скоро след появата на симптомите.

Ако имате въпроси за начина на действие на Фамвир или защо това лекарство Ви е било предписано, поитайте Вашия лекар.

2. Преди да приемате Фамвир

Фамвир е предписан лично на Вас от Вашия лекар. Следвайте стриктно инструкциите на Вашия лекар дори, ако те се различават от информацията в тази листовка.

Не приемайте Фамвир

- Ако сте алергичен/на (имате свръхчувствителност) към фамцикловир, пенцикловир или някое от помощните вещества на Фамвир, изброени в началото на тази листовка.

Ако считате, че може да имате алергия, потърсете Вашия лекар за съвет.

Необходимо е особено внимание с Фамвир

- Ако имате проблеми с бъбреците
- Ако сте бременна или планирате да забременеете скоро.
- Ако кърмите.
- Ако имате проблеми с имунната система.
- Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, напр. лактоза. Фамвир 250 mg филмирани таблетки съдържат лактоза.

Ако някое от по-горе изброените важи за Вас, **информирайте Вашия лекар, преди да започнете лечение с Фамвир.**

Трябва да избягвате сексуални контакти, ако имате симптоми на херпес, дори ако сте започнали терапия. В противен случай може да предадете херпесната инфекция на Вашия партньор.

Фамвир и хора в напреднала възраст

Фамвир може да се прилага при хора в напреднала възраст.



Фамвир и деца

Обикновено Фамвир не се препоръчва при деца.

Бременни жени

Ако сте бременна или считате, че може да сте бременна, информирайте Вашия лекар. Фамвир не трябва да се прилага по време на бременност, освен ако не е строго наложително. Вашият лекар ще обсъди с Вас потенциалните рискове от терапията с Фамвир по време на бременност.

Кърмещи майки

Ако кърмите, информирайте Вашия лекар. Той/тя ще Ви посъветва дали да приемате Фамвир докато кърмите, в зависимост от ползите и рисковете в конкретната ситуация.

Шофиране и работа с машини

Няма данни, че Famvir (famciclovir) оказва влияние върху способността на пациентите да шофират или да работят с машини. Все пак ако изпитвате замаяност, съниливост, обърканост или други нарушения от страна на централна нервна система, докато приемате Фамвир, не трябва да шофирате или да работите с машини.

Прием на други лекарства

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или насъкоро сте приемали други лекарства, в това число и тези, които са без рецептa или на билкова основа. Това е особено важно, ако лекарството, което взимате, може да засегне бъбреците Ви, напр. пробенецид.

3. Как да приемате Фамвир?

Следвайте стриктно инструкциите на Вашия лекар. Не надвишавайте препоръчаната Ви доза.

Колко да приемате?

Херпес зостер

Препоръчителната доза за остра фаза на херпес зостер е една таблетка от 250 mg три пъти дневно или 500 mg два пъти дневно, или 750 mg веднъж дневно, в продължение на седем дни.

Препоръчителната доза за офтalamологичен зостер е една таблетка от 500 mg три пъти дневно, в продължение на седем дни.

При пациентите, изложени на риск от пост-херпесна невралгия се препоръчва доза от 250-500 mg три пъти дневно, в продължение на 7 дни, за да се намали продължителността и степента на появя на пост-херпесна невралгия.

При хора, чиято имунна система не функционира достатъчно добре, препоръчителната доза е 500 mg три пъти дневно, при продължителност от 10 дни.

Генитален херпес при пациенти с нормална имунна защита

Първа појава на генитален херпес

Препоръчваната доза при първа појава на генитален херпес е една таблетка от 250 mg три пъти дневно, в продължение на лет дни.

Повторна појава на генитален херпес



Дозата при повторна појава на генитален херпес е 125 mg два пъти дневно, в продължение на пет дни.

Генитален херпес при пациенти с понижена имунна защита

500 mg Фамвир два пъти дневно, в продължение на седем дни.

Потискане на инфекция на генитален херпес

За потискане на инфекция на генитален херпес, трябва да приемате една таблетка от 250 mg два пъти дневно. Вашият лекар ще Ви каже колко дълго да приемате таблетките.

При хора, чиято имунна система не работи достатъчно добре, дозата и продължителността на лечение следва да се повишат.

При хора с нарушена бъбречна функция, дозата може да се понизи.

Кога и как да приемате Фамвир?

Вземете първата таблетка, колкото се може по-скоро след появата на ранните симптоми и признаци (мехури, парене и болка). Винаги приемайте Фамвир точно, както Ви е предписал Вашият лекар.

Гълтайте всяка от таблетките цяла, с чаша вода. Фамвир може да се приема с или без храна. Не е необходимо да дъвчете или чупите таблетката.

Колко дълго да приемате Фамвир?

Следвайте инструкциите на Вашия лекар.

Ако погълнете повече Фамвир, от необходимото

Ако вземете повече таблетки отколкото трябва, или ако някой друг случайно погълне Вашето лекарство, свържете се с Вашия лекар или се обадете незабавно в болница за съвет. Покажете опаковката с таблетките.

Ако забравите да вземете Фамвир

Ако забравите да вземете Фамвир, приемете необходимата доза, веднага щом се сетите. Ако почти е станало време за следващата Ви доза, пропуснете дозата, която сте забравили и вземете следващата доза в обичайното време. Не удвоявайте дозата, за да компенсирате забравената доза. Това може да увеличи вероятността за поява на нежелана реакция.

4. Възможни нежелани реакции

Като всички лекарства, Фамвир може да има нежелани ефекти. Нежеланите ефекти, причинени от Фамвир са обикновено леки до умерени.

Някои нежелани реакции може да са сериозни:

Информирайте Вашия лекар незабавно или отидете в спешно отделение в най-близката болница, ако забележите някой от следните ефекти:

- Мехури по кожата и/или лигавиците на устните, очите, устата, носните канали или половите органи в тежка степен (признаци на сериозни кожни реакции)



- Необяснима појава на синини, червени или пурпурни петна по кожата или кървене от носа (признания на понижение на броя на кръвните площици - тромбоцити)

Други нежелани ефекти:

Рядко (с вероятност да засегнат 1 до 10 на всеки 10000 пациента), може да изпитате неразположение, повръщане, главоболие или объркане (обикновено при хора в напреднала възраст).

Много рядко (с вероятност да засегнат по-малко от 1 на всеки 10000 пациента), може да усетите замаяност, сънливост (обикновено при хора в напреднала възраст), халюцинации (да виждате или чувате неща, които не съществуват), пожълтяване на кожата и/или очите, кожен обрив или сърбежи.

Ако някое от тези състояния продължи по-дълго или е смущаващо, **информирайте Вашия лекар.**

Ако забележите нежелани ефекти, които не са споменати в тази листовка, **информирайте Вашия лекар или фармацевт.**

5. Съхранение на Фамвир

- Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
- Да се съхранява при температура под 30° С.
- Да се съхранява в оригиналната опаковка.
- Да не се използва след изтичане на срока на годност, отбелязан на опаковката.
- Не използвайте лекарството, ако опаковката е повредена или има признания на фалшификация.
- Използвайте таблетките според предписанието. Ако Ви останат таблетки, върнете ги на Вашия фармацевт.

6. Допълнителна информация

Ако имате допълнителни въпроси за това лекарство, моля обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Срок на годност: 3 години

Представител на притежателя на разрешението за употреба

Novartis Pharma Services Inc.

Бизнес Парк София, сграда 11

Ж.к. Младост 4, София 1715

Тел: 02/976 98 28

Факс: 02/976 98 29

Дата на последна редакция на листовката: 19.05.2005 г.

Регистрационен номер: 20010248/26.02.2001 г.

Дата на първата регистрация в България: 21.04.1995 г.

