

ИАЛ  
ОДОБРЕНО!  
ДАТА ...20.06.06.....

RGD: 58948/E/2  
RGD: 58082/H/2

Информация за пациента

**КВАМАТЕЛ (QUAMATEL)**  
филмирани таблетки 20 mg или 40 mg

**Моля, прочетете внимателно листовката, преди да започнете да приемате лекарството.**

- Моля, запазете тази листовка. Възможно е да поискате да я прочетете отново.
- Ако искате да знаете повече за Вашето лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Лекарят е предписал това лекарство на Вас. Не го давайте на друг. Възможно е да му навреди, дори да има симптоми подобни на Вашите.

**Какво е действието на Квамател филмирани таблетки и при какви заболявания се прилага?**

Фамотидин, активната съставка на лекарството, намалява количеството киселина и пепсин образувани в стомаха. Прилага се за лечение на язви на началната част на тънкото черво, свързана към стомаха, (язви на дванадесетопръстника) и доброкачествени язви на стомаха (стомашни язви), за лечение на симптоми предизвикани от рефлукс на стомашен сок в хранопровода и за лечение на други заболявания свързани със свръхпродукция на стомашна киселина (напр. синдром на Zollinger-Ellison). Също така се прилага за профилактика на рецидив на язвите. В случай на обща анестезия се прилага за профилактика на поглъщането на стомашна киселина (синдром на Mendelson).

**Какви активни и неактивни съставки съдържа Квамател филмирани таблетки?**

Активно вещество: 20 mg и 40 mg famotidine.

Неактивни съставки:

**Сърцевина:** колоиден безводен силициев диоксид, магнезиев стеарат, повидон, натриев нишестен глюколат (тип A), талк, царевично нишесте, лактоза, моногидрат.

**Филмиращо покритие:** червен железен оксид (E 172), колоиден безводен силициев диоксид, титаниев диоксид (E 171), макрогол 6000, Сепифилм 003 (хипромелоза + макрогол стеарат).

**Кога не трябва да се приема Квамател филмирани таблетки?**



Квамател филмирани таблетки не трябва да се прилага при свръхчувствителност към активната съставка или към някое от помощните вещества на лекарството.

При деца, по време на бременност и кърмене (поради липса на опит).

**Позволено ли е да се приема Квамател филмирани таблетки по време на бременност и кърмене?**

Употребата на Квамател филмирани таблетки не се препоръчва по време на бременност.

Фамотидин се секрецира в кърмата при хора и по тази причина кърменето трябва да се преустанови, когато е необходимо приложението на Квамател.

*Ако сте бременна или кърмите, говорете с Вашия лекар и следвайте неговия съвет.*

**Какво трябва да знаете преди да започнете лечението?**

Преди да започне лечението трябва да бъде изключено злокачествено заболяване на стомаха.

В случай на чернодробно увреждане Квамател трябва да се прилага в намалена доза, така както е предписано от Вашия лекар.

Тъй като са съобщени случаи на кръстосана чувствителност в групата на различните антиацидни средства, пациентите с анамнеза за свръхчувствителност към други антиациди могат да приемат Квамател под медицински контрол.

Ако имате бъбречен проблем, Вашият лекар ще коригира дозата в зависимост от здравословното Ви състояние.

В случай на непоносимост към лактоза трябва да се вземе в предвид, че Квамател филмирани таблетка 20 mg съдържа 105 mg лактоза, а Квамател филмирани таблетка 40 mg съдържа 90 mg лактоза.

**Може ли да приемате други лекарства едновременно с Квамател филмирани таблетки?**

Трябва да уведомите Вашия лекар или фармацевт за всички лекарства, които приемате или сте приемали напоследък, включително и за такива отпусканни без рецепт.

Фамотидин не повлиява обмяната на други лекарства в черния дроб. Поради понижаване на стомашната киселинност, абсорбцията на лекарствата приемани едновременно с Квамател може да бъде намалена. Ако, също така употребявате антиацид, той трябва да се приема 2 часа след приема на Квамател.

Приемът на храна и течности не повлиява абсорбцията на Квамател.

**Как Квамател филмирани таблетки повлияват способността за шофиране и работа с машини?**

Няма данни за какъвто и да било ефект на Квамател върху способността за шофиране и работа с машини.

**Как трябва да се приема Квамател филмирани таблетки?**



Квамател филмирани таблетки трябва да се приема в доза, по начин и за период от време съгласно предписанието на Вашия лекар.  
Филмирани таблетки Квамател трябва да се погълнат цели с малко вода.

#### **Какви са симптомите на предозиране?**

Съгласно нашите данни, приложението на дози от 800 mg дневно за повече от една година не води до никакви сериозни странични ефекти.

#### **Какво трябва да направите в случай на предозиране с Квамател филмирани таблетки?**

Лечение на предозирането: изпразване на стомаха (стомашна промивка), симптоматична и поддържаща терапия и клинично проследяване на пациента.

#### **Какви са възможните нежелани реакции на Квамател филмирани таблетки и какво да се предприеме, ако те настъпят?**

Както всички лекарства, Квамател филмирани таблетки понякога може да причини нежелани реакции при някои пациенти.

По време на лечение с Квамател са наблюдавани следните нежелани реакции:

Рядко: главоболие, замаяност, диария или запек

Много рядко:

*Организма като цяло*: леко повишена температура, загуба на апетит и уморяемост.

*Сърце и кръвносни съдове*: неправилна сърдечна дейност (аритмия).

*Стомах и черва*: жълтеница, промени в чернодробните ензими, повръщане, гадене и сухота в устата.

*Костна и мускулна система*: мускулни крампи и болезнени стави.

*Нервна система*: халюцинации, обърканост, възбуда, чувство на депресия и тревожност.

*Дихателна система*: бронхиален спазъм.

*Кожа*: сърбеж, суха кожа и обрив.

*Други*: уколемяване на гърдите при мъже, което обично изчезва след прекратяване на лечението.

Промени в лабораторните показатели показващи увреда на кръвотворната система.

Както при всяко лекарство и при прием на Квамател филмирани таблетки може да настъпят реакции на свръхчувствителност. Следователно, ако усетите някой от следните симптоми, като кожен обрив, сърбеж или какъвто и да е необичаен симптом (напр. висока температура, болка в гърлото, затруднено дишане), незабавно трябва да посетите Вашия лекар.

#### **Как трябва да се съхраняват филмирани таблетки Квамател?**

**Съхранявайте в оригиналната опаковка за да ги предпазите от светлина.**



Не използвайте това лекарство след срока на годност отбелаязан върху  
опаковката.

*Съхранявайте това лекарство на място далеч от достъпа на деца.*

*Дата на последно одобрение на листовката: 11 Септември 2002*

