

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

CEFALEXIN ЦЕФАЛЕКСИН

СЪСТАВ

Активно вещество: В една капсула Cefalexin 250 mg - Cefalexin monohydrate 262 mg

В една капсула Cefalexin 500 mg - Cefalexin monohydrate 526 mg

Помощни вещества: магнезиев стеарат

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА

Цефалексин капсули 250 mg по 10 броя в блистер; по 2 блистера в кутия

Цефалексин капсули 500 mg по 10 броя в блистер; по 2 блистера в кутия

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

"Балканфарма-Разград" АД

бул. "Априлско въстание" N 68

Разград 7200

България

ДЕЙСТВИЕ

Цефалексин е антибиотик от цефалоспориновата група. Той унищожава бактериите чрез блокиране на ензими, участващи с изграждането на бактериалната клетъчна стена.

ПОКАЗАНИЯ

Цефалексин се използва за лечение на инфекции, причинени от чувствителни към него микроорганизми.

Подходящ е при инфекции на ушите, носа, гърлото, дихателната система, пикочо-половата система, кожата и меките тъкани.

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Продуктът не се прилага при свръхчувствителност към Цефалексин или други цефалоспоринови антибиотици.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

Цефалексин трябва да се прилага с особено внимание на пациенти със сенна хрема, бронхиална астма, копривна треска и установена свръхчувствителност към пеницилини.

Цефалексин, както всички широкоспектърни антибиотици може да повлияе отрицателно физиологично нормалната чревна флора. Ако се установят някакви стомашно-чревни смущения, които не се подобряват след преустановяване лечението с Цефалексин, моля, посъветвайте се с Вашия лекар.

Може да бъде наблюдавана преходна промяна в стойностите на показателите за чернодробна функция. Лабораторните изследвания на тези показатели трябва да се извършват преди сутрешния прием на Цефалексин.

Цефалексин капсули не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Уведомете Вашия лекар, ако приемате някои от изброените лекарства!

Цефалексин може да повиши риска от бъбречно увреждане ако се приема едновременно с фурантрил, етакринова киселина и увреждащи бъбреците лекарства.

Индометацин и салицилати забавят излъчването на Цефалексин от организма.

Цефалексин може да засили действието на *противосъсирващите средства*.

Комбинирането на Цефалексин с хларамфеникол и тетрациклинови антибиотици води до отслабване на противомикробния ефект.

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ БРЕМЕННИ И В ПЕРИОДА НА КЪРМЕНЕ

Не се препоръчва употребата на Цефалексин по време на бременност и кърмене.

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ

Цефалексин капсули не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Употребявайте лекарството само както Вашият лекар Ви е назначил.

Цефалексин капсули се прилага през устата, като обичайната доза за възрастни е 1 g - 4 g за 24 часа, разпределена в три-четири приема. По преценка на лекаря дозата може да се увеличи до 6 g за 24 часа.

За деца дневна доза 25 - 50 mg на килограм телесна маса в четири приема на 6 часов интервал.

По преценка на лекаря дозата може да достигне 100 mg/kg, разделена на 3-4 приема, като максималната дневна доза е 4 g.

При лечение на пациенти с бъбречна недостатъчност денонощната доза трябва да се съобрази със съответните стойности на креатининовия клирънс.

Продължителността на лечението се определя от лекуващия лекар.

Моля, спазвайте този срок дори и когато сте се почувствали по-добре още след първите няколко приема.

Необходима е незабавна консултация с лекуващия лекар за съответна промяна на дозата.

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПРЕДОЗИРАНЕ

В случай на предозиране, незабавно се консултирайте с лекуващия лекар! Предозирането на **Цефалексин** най-често е свързано с поява на гадене, повръщане, стомашни болки, диария, кръв в урината.

За извеждане на неусвоеното количество **Цефалексин** се препоръчва даване на активен въглен или средства предизвикващи повръщане.

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПРОПУСКАНЕ НА ДОЗА

Моля, спазвайте указанията на лекаря за да имате максимална полза от **Цефалексин** капсули.

Продължете прилагането на лекарството докато завърши целия курс на лечение, препоръчен Ви от Вашия лекар. Не го спирайте само защото се чувствате по-добре; медикаментът може да не е унищожил всички микроби и Вашето състояние да се влоши отново.

Двойната доза **Цефалексин** не може да компенсира пропуснатия прием.

Ако не се чувствате добре или ако имате някакви оплаквания, които не разбирате, незабавно се консултирайте с Вашия лекар.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Ако забележите никакви нежелани реакции, дори и такива които не са отбелязани в тази листовка и предполагате, че са в резултат от приемането на медикамента, или ако не сте сигурен в ефекта на този продукт, моля информирайте за това лекуващия Ви лекар или фармацевт.

Цефалексин се понася добре, но понякога са възможни *алергични реакции-кожни обриви, сърбези, копривна треска*. Тези реакции обикновено отшумяват след прекратяване на лечението.

Може да се появи *главоболие, виене на свят, умора*.

Рядко се наблюдава *гадене, повръщане, коремни болки, диария, колити*.

При лечение с цефалоспорини е възможно да се появят *преходен хепатит, застойна жълтеница, обратими нефрити*.

Други нежелани реакции са *генитални и анални сърбези, гъбична инфекция на влагалището, възпаление на влагалището и отделяне на вагинален секрет*.

Може да се получи преходна промяна в стойностите на показателите за чернодробна функция.

СЪХРАНЕНИЕ

При температура под 25⁰ С!

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

СРОК НА ГОДНОСТ

Три години.

Да не се употребява след изтичане срока на годност, обозначен върху опаковката.

ДАТА НА ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ТЕКСТА

Юни, 2001 год.