

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА ЛАМОТРЕН



Моля, прочетете внимателно тази листовка преди да започнете приема на Ламотрен или преди да го дадете на някого, за когото се грижите. Листовката съдържа важна информация за лечението. Ако у вас възникнат накакви съмнения или въпроси, или ако не сте сигурни за нещо, попитайте лекуващия лекар.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕКАРСТВОТО:

Вашето лекарство се нарича Ламотрен и представлява бледо жълти обли таблетки. Таблетките съдържат съответно 25 mg, 50 mg или 100 mg от лекарственото вещество lamotrigine (ламотрижин).

Съдържа следните помощни вещества: лактоза монохидрат, микрокристална целулоза, натриев нишесте гликолат, магнезиев стеарат, повидон, железен оксид жълт, пречистен талк, колоидален безводен силиций. В една опаковка Ламотрен има 30 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба:

"Чайка фарма - висококачествените лекарства" АД
Ул."Н. Й. Вапцаров" 1, Гр. Варна 4000, България

При какви заболявания се приемат таблетки Ламотрен:

Ламотрен принадлежи към групата на лекарствата, наричани антиконвулсанти (противогърчови). Приема се за лечение на различни видове епилепсия, самостоятелно или в комбинация с други антиепилептични средства, при възрастни и деца над 2 годишна възраст. Ламотрен е показан също така и за предотвратяване на епизоди на промяна в настроението при пациенти с биполарно афективно разстройство, главно чрез предотвратяване на депресивните епизоди.

Кой може да приема Ламотрен таблетки?


Това лекарство е подходящо за много хора, но все пак при някои приемът на лекарството не се препоръчва. Преди да започнете да го използвате си задайте следните въпроси, за да е убедите, че употребата на таблетки Ламотрен е правилна във вашия случай:

- Бременна ли сте, планирате ли бременност скоро?
- Кърмите ли?
- Имали ли сте преди това прояви на алергични реакции към lamotrigine, или някоя от останалите съставки на таблетките, изброени по-горе?
- Приемате ли други лекарства?
- Приемате ли таблетки против забременяване или хормонозаместителна терапия?
- Страдате ли от болестта на Паркинсон?
- Имали ли сте оплаквания от страна на черния дроб или бъбреците?

Ако отговорът ви на някой от тези въпроси е "ДА" или в случай, че тези въпроси не са обсъждани с лекуващия лекар, посъветвайте се с него, преди да започнете приема на Ламотрен таблетки.

Как трябва да приемате таблетки Ламотрен?

Моля, обърнете внимание, че Вашият лекар може да ви даде указания, които са различни от описаните по-долу. Важно е да приемате лекарството точно както лекарят ви е предписал. Ако не сте сигурни в нещо, посъветвайте се с него. Дозировката, която ви е предписал лекарят, зависи от това дали приемате и други антиепилептични лекарства и какви са те. Това е особено важно, ако приемате лекарство, съдържащо valproate.



При лечение на епилепсия:

Възрастни и деца над 12 години:

Обичайната дозировка за контрол над епилепсията е между 100 и 400 mg в един или два приема дневно. В началото на приема на Ламотрен лекарят ще Ви предпише **много по-ниска доза** от тази и постепенно ще увеличава дозата в течение на няколко седмици до достигане на оптималната доза за контрол на заболяването.

Деца от 2 до 12 години:

Обичайната дозировка за контрол над епилепсията е между 1 и 5 mg на килограм телесна маса на детето, в един или два приема дневно. В началото на приема на Ламотрен лекарят ще предпише на детето много по-ниска доза от тази и постепенно ще увеличава дозата в течение на няколко седмици. Комбинираната терапия с valproate (валпроат) при новодиагностицирани болни в детска възраст (от 2 до 12 години) изисква прилагането на доза до 15 mg Ламотрен на килограм телесно тегло.

Не се препоръчва прилагането на Ламотрен при деца под 2-годишна възраст, както и при деца с телесно тегло под 17 килограма.

При лечение на биполарно афективно разстройство:

Възрастни (над 18 години):

Обичайната доза за овладяване на биполарно афективно разстройство е между 100 и 400 mg разделени в един или два приема дневно. В началото на приема на Ламотрен лекарят ще Ви предпише **много по-ниска доза** от тази и постепенно ще увеличава дозата в течение на няколко седмици. Определянето на дозата зависи до голяма степен от това дали провеждате допълващо лечение с ензимни инхибитори, индуктори или други лекарства, чието повлияване върху приема на Ламотрен.

Деца (под 18 години): Ламотрен не се препоръчва за лечение на биполарно разстройство при деца под 18-годишна възраст.

Прекъсване на приема на Ламотрен: Въпреки, че не са известни неблагоприятни ефекти при прекъсване лечението с Ламотрен, винаги се консултирайте с лекуващия лекар преди да спрете да приемате лекарството.

Ако имате бъбречно или чернодробно заболяване: Вашият лекар може да ви предпише по-ниски от препоръчаните дози, в зависимост от степента на бъбречното или чернодробно заболяване.

Хормонална контрацепция: Ако приемате таблетки против забременяване или сте подложена на хормонозаместителна терапия, Вашият лекар може да Ви предпише по-висока поддържаща доза, в зависимост от това как се повлиява Вашето лечение.

Приемайте таблетките с малко вода. Не ги дъвчете.

Ако сте забравили да приемете някоя от дозите не се безпокойте. Приемете дозата веднага след като си спомните и продължете приемането на следващите дози точно според определеното време. Ако обаче е приближило времето за следващия прием, изчакайте до неговото настъпване и приемете направо следващата доза! **Не приемайте двойна доза!**

Ако приемете прекалено висока доза Ламотрен или ако някой друг приеме по грешка Вашето лекарство, съобщете незабавно на лекаря.

Не прекъсвайте внезапно приема на лекарството. Консултирайте се с Вашия лекар.

преди това. Както и при другите антиепилептични лекарства, внезапното преустановяване на лечението с Ламотрен може да провокира отново появата на гърчове. Освен при съображения за безопасност, например тежки кожни реакции, които налагат внезапно спиране на лечението, дозата на Ламотрен трябва да се намалява постепенно в продължение на поне 2 седмици.

Бременност и кърмене:

Ламотрен не трябва да се използва при бременност и кърмене, освен в случай на категорична необходимост, и само след консултация с лекар.

Уведомете лекуващия лекар възможно най-скоро, ако забременеете по време на лечението с Ламотрен.

Шофиране и работа с машини:

При прием на лекарството е възможна поява на замаяност и двойно виждане. Има разлика при повлияването от лечението с антиепилептични лекарствени средства при отделните пациенти. Ако решите да извършвате дейности, свързани с шофиране или работа с машини, потърсете специализирана лекарска консултация предвид опасността от поява на епилептичен пристъп по време на такава дейност.

Възможни нежелани лекарствени реакции:

Подобно на всяко друго лекарство, Ламотрен може да причини нежелани (странични) реакции. При повечето хора приемането на това лекарство не причинява проблеми.

Ако се появят някои от следните симптоми, трябва незабавно да уведомите Вашия лекар, тъй като ако ги отминете, без да им обърнете внимание могат да последват по-сериозни проблеми (известно е, че някои от тези реакции се срещат по-често при децата и родителите трябва да обърнат особено внимание на това):

- неочаквани кожни реакции, например обрив и/или възпаление на устата или очите,
- оток на лицето,
- повишена температура, както и симптоми подобни на тези на грип, отоци на жлезите или сънливост, или ако епилепсията ви се влоши, особено през първите месеци на лечението с Ламотрен.
- повишена уморяемост, безпричинни на пръв поглед наранявания или кървене, зачестяване на инфекциозните заболявания (например настинка), или ако гърлото ви се възпали.

Уведомете лекаря, колкото е възможно по-скоро, ако забележите някои от следните реакции: замъглено виждане, зачервяване на очите (конюктивит), световъртеж, главоболие, проблеми с пазенето на равновесие, нарушения на съня, усещане за разболяване, диария, халюцинации, чувство на раздразнение, агресивност, възбуденост или обърканост.

В редки случаи се съобщава за аномалии в чернодробната функция. Уведомете лекаря незабавно, ако при вас се появят някои от следните симптоми, независимо от това дали са свързани с усещане, че се разболявате, или не:

- пожълтяване на кожата,
- сърбеж
- коремна болка и/или стягане на коремната мускулатура.

Съобщете на Вашия лекар, ако забележите някакви други, споменати нежелани реакции.

Съхранение:

Съхранявайте таблетките Ламотрен при температура под 25 °С. Съхранявайте лекарството на сухо и безопасно за деца място (далеч от погледа и досега им). Пазете лекарството от въздействието на директна топлина и светлина.

Таблетките не трябва да се използват след означения на опаковката срок на годност.

ПОМНЕТЕ !!!

Това лекарство е само за вас. Никога не го претстъпвайте на други хора. То може да им навреди, дори ако техните симптоми са същите или подобни на Вашите.

Допълнителна информация:

Тази листовка не съдържа цялата информация за лекарството. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар.

Дата на последна ревизия на листовката:

Юни 2006г.

