

FORTUM™
powder for solution for injection

ФОРТУМ™
прах за инжекционен разтвор

ceftazidime pentahydrate

Тази листовка се отнася само за Fortum. Моля, прочетете я внимателно. Пазете я, тъй като може да ви се наложи да я прочетете отново. Ако искате да знаете повече за вашето заболяване или лекарство, попитайте лекаря.

Наименование на лекарството

Името на лекарството е Fortum (Фортум).

Какво представлява и какво съдържа Fortum

Fortum е под формата на прах за инжекционен разтвор.

Всеки флакон съдържа:

- 500 mg или 1g от лекарственото вещество ceftazidime (цефтазидим) под формата на ceftazidime pentahydrate (цефтазидим пентахидрат).
- натриев карбонат като помощно вещество. Съдържанието на натрий във Fortum 1g е 26 mg и съответно 52 mg във Fortum 500 mg.

Кой произвежда лекарството и притежава разрешение за употребата му в България

Fortum се произвежда от GlaxoSmithKline SpA, Via A Fleming 2, Verona 37135, Италия.

Притежател на разрешението за употреба е Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, UK с представител в България GlaxoSmithKline Export Ltd., София 1408, кв. Иван Вазов, ул. Димитър Манов, бл.10.

Как действа и за какво се използва лекарството

Лекарственото вещество ceftazidime е антибиотик от групата на цефалоспорините.

Цефалоспорините действат бактерицидно т.е. убиват патогените (микроорганизмите, които причиняват инфекции), като подтискат синтеза на клетъчната им стена.

Fortum е активен срещу широк спектър патогени. Използва се за лечение на инфекции, причинени от един патоген или смесени инфекции, включително тежки общи инфекции.

С Fortum могат да бъдат лекувани заболявания на дихателната система, ухото, носа, гърлото, отделителната система, червата, корема, жълчния мехур, костите, ставите, меките тъкани, кожата и обвивките на мозъка (менингит).


Fortum се използва и за лечението на инфекции, които могат да се появят след хемодиализа или за предотвратяване на инфекции след някои хирургични операции.

Понякога Fortum се прилага в комбинация с други антибиотици за лечение или предотвратяване на инфекции.

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕ УПОТРЕБАТА НА FORTUM

Това лекарство е подходящо за повечето хора, но има някои хора, които не трябва да го употребяват. Задайте си следващите въпроси, за да разберете дали Fortum е подходящ за вас.

- Имати ли сте алергична реакция към Fortum, ceftazidime или някой друг антибиотик?
- Бременна ли сте или се опитвате да забременеете?
- Кърмите ли?
- Имате ли заболяване на бъбреците?
- Приемате ли диуретици като furosemide?
- Приемате ли друг антибиотик, напр. chloramphenicol или aminoglycoside?
- Предписана ли ви е диета с ниско съдържание на натрий?



Ако отговорът на някой от въпросите е "да", кажете на лекуващия лекар за това преди да започне приложението на лекарството. Ако не сте сигурни, посъветвайте се с лекуващия лекар.

Как се прилага Fortum

В опаковката Fortum е под формата на прах, затова преди да бъде приложено, лекарството трябва да се разтвори. Прилага се интравенозно или интрамускулно от квалифицирано медицинско лице. В някои случаи лекарството може да бъде добавено към банка за капкова инфузия.

Дозировка

При повечето инфекции обичайната доза за възрастни е 1g ceftazidime три пъти дневно или 2g ceftazidime два пъти дневно. Дозите могат да бъдат по-ниски или по-високи в зависимост от тежестта и вида на инфекцията, теглото, възрастта и бъбреchnата функция.

Продължителността на лечението зависи от вида на инфекцията.

За предотвратяване на инфекция след хирургична операция се прилага 1g ceftazidime преди операцията. След операцията може да се приложи втора доза от 1 g.

За деца и бебета дозата се определя в зависимост от телесното тегло.

Деца на възраст над 2 месеца - от 30 mg до 100 mg на килограм телесно тегло, разделени в 2 или 3 отделни приема. При деца с тежка инфекция обичайната дозировка е до 150 mg на килограм телесно тегло (до максимална дневна доза 6g), разделена в 3 отделни приема.

Новородени и бебета на възраст под 2 месеца - от 25 до 60 mg на килограм телесно тегло, разделени в 2 приема.

За пациенти в напреднала възраст общата дневна доза на ceftazidime се определя в зависимост от показателите на бъбреchnата функция.

За пациенти с умерени до тежки бъбреchnи заболявания дозата на Fortum е по-ниска.

За пациенти с бъбреchnа недостатъчност на продължителна артериовенозна хемодиализа или високоскоростна хемофильтрация дозата е 1g дневно, разделена на няколко приема.

За пациенти, на които са назначени хемодиализни курсове, определената доза трябва да се повтаря след всеки период, през който пациентът е на хемодиализа. Това се налага, тъй като част от лекарството може да бъде отстранена от тялото по време на диализата и е необходимо да бъде набавена отново.

Fortum може да бъде приложен при пациенти на перitoneална диализа и продължителна амбулаторна перitoneална диализа. Може да бъде приложен интравенозно или да бъде включен в диализната течност (обикновено 125-250 mg ceftazidime на 2 литра диализна течност).

За лечение на белодробни инфекции при пациенти с муковисцидоза и нормална бъбреchnа функция се прилагат високи дози от 100 mg до 150 mg на килограм телесно тегло на ден (до 9 g дневно при възрастни и 6 g дневно при деца), разделени в три приема. В някои случаи, родител на дете с муковисцидоза или възрастен пациент с муковисцидоза може да бъде специално обучен как да прилага Fortum в къщи.

Лекарството ще ви бъде прилагано от квалифицирано медицинско лице. Ако считате, че сте приели по-голямо количество от лекарството или че сте пропуснали доза, уведомете лекуващия си лекар.

Ако лекарят ви е обучил как самостоятелно да прилагате Fortum и смятате, че приложеното от вас количество е прекалено голямо, незабавно уведомете лекуващия лекар или се обадете на Бърза помощ. Ако пропуснете да приемете доза, приемете следващата веднага след като си спомните и продължете както преди.

Както всички антибиотици, Fortum трябва да се приема според предписанията на лекуващия лекар, докато курсът на лечение приключи.

СЛЕД ПРИЕМ НА ЛЕКАРСТВОТО

Нежелани лекарствени реакции

Наред с желаните, лекарството може да причини и нежелани лекарствени реакции. Fortum не създава проблеми при повечето хора, които го приемат. Но подобно на всяко друго лекарство, при някои пациенти продуктът може да доведе до нежелани реакции.

Някои хора могат да имат алергия към лекарството. Уведомете лекаря си незабавно, ако се появят някои от следните редки тежки алергични симптоми:

- Внезапно хръптене и тежест в гърдите
- Подуване на клепачите, лицето или устните
- Подуване на кожата или копривна треска
- Кожен обрив, сърбеж, температура
- Колапс

Консултирайте се с лекуващия лекар **възможно най-скоро**, ако се появи някоя от следните нежелани реакции:

Не чести

- Болка или възпаление на инжекционното място.
- Главоболие, замаяност, мравучкания по крайниците и лош вкус в устата.
- Гадене или повръщане, болка в стомаха.
- Диария.

Редки

- Гъбично възпаление на лигавицата на устата или влагалището.
- Тежка диария, предизвикана от колит (възпаление на дебелото черво).
- Реакция, при която кожата изглежда като попарена.

Fortum може да предизвика промени в нормалните стойности на определени кръвни клетки или други съставки на кръвта, или да доведе до други отклонения в кръвните показатели. Ако си правите изследване на кръвта по някаква причина, уведомете медицинското лице, което взима кръвната проба, че приемате Fortum, тъй като това може да повлияе на резултатите ви. Ако си правите изследване за захар в урината, Fortum може да предизвика фалшиво положителен резултат.

При приложение на прекалено висока доза от лекарството, по-специално при хора с увредена бъбречна функция, Fortum може да предизвика треперене, гърчове и понякога кома.

Ако след приложение на Fortum не се чувствате добре или чувствате необичаен дискомфорт, съобщете за това на лекуващия лекар **възможно най-бързо**.

КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ЛЕКАРСТВОТО

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Съхранявайте неотворените флакони с Fortum на стайна температура под 25°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, на място, защитено от светлина.

Препоръчва се продуктът да бъде приложен веднага след разтваряне.

Ако това не е възможно, да се съхранява при стайна температура под 25°C за не повече от 18 часа или при +2°C до +8°C за не повече от 7 дни.

Да не се използва след датата на изтичане на срока на годност, посочена върху опаковката.

Запомнете!

Това лекарство е единствено за вас. Само лекар може да ви го предпише. Никога не го преотстъпвайте на друг човек. То може да му навреди, дори ако симптомите му са същите или подобни на вашите.

Тази листовка не дава пълна информация за лекарството. Ако имате въпроси или не разбирате нещо, посъветвайте се с лекар.

Fortum (Фортум) е запазена марка на GlaxoSmithKline Group of companies.

Дата на последна редакция – Ноември 1998 г.

