



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Macmiror complex
/Nifuratel, Nystatin/

Макмирор комплекс

Макмирор комплекс е комбинация на Nifuratel и Nystatin.

Нифурател е химиотерапевтично средство, разработено в изследователските лаборатории на фирмата "Poli" Италия, с интензивно трихомонацидно, антибактериално и фунгистатично действие. Това многостранно въздействие позволява лечение на вагинити със смесена етиология, профилактика на микози, предизвикани от специфичното лечение на трихомониази.

Нистатин е добре известен фунгициден антибиотик, особено ефективен при лечение на мицети от типа Candida.

Ефективността и извънредно ниската токсичност на продукта позволяват широката му употреба в клиничната практика, особено чрез локално приложение.

Комбинацията на нифурател и нистатин позволява достигането на пълен фунгициден ефект и провеждането на многостранно лечение на вагинит, което обезпечава унищожаването на патогенните агенти, предизвикващи инфекцията /Кандида, Трихомонас, бактерии/ и възстановява физиологичните условия във влагалището. Препаратът предотвратява рецидивите, които могат да възникнат след излекуване на първичните инфекции.

Показания

Комплексно лечение на вулвовагинални инфекции, причинени от патогенни микроорганизми: Candida, Trichomonas и бактерии.

Противопоказания

Лекарственият продукт е противопоказан при пациенти с данни за свръхчувствителност към нистатин и нифурател.

Предупреждение

Продължителната употреба на лекарствения продукт може да предизвика развитие на свръхчувствителност.

При поява на признаци на свръхчувствителност, приложението на лекарствения продукт трябва да се преустанови.

По време на лечението трябва да се избягва осъществяване на полови контакти.

Лекарствена форма и големина на опаковката

Макмирор комплекс 500: 12 вагинални капсули

Макмирор комплекс унгвент: туба от 30 g

Макмирор комплекс 500:

Състав

1 вагинална супозитория съдържа лекарствено вещество:

Nifuratel - 500 mg

Nystatin 200000 U



excipiens: quantum satis

Дозировка

1 вагинална капсула дневно или съгласно предписанието на лекаря.

Начин на приложение

За постигане на оптимален лечебен ефект, вагиналните капсули трябва да се поставят в най-горната част на влагалището.

Макмирор комплекс унгвент

Състав:

100 g унгвент съдържат:

Nifuratel - 10 g

Nystatin 4000000 U

Опаковката е снабдена с градуирана спринцовка.

Дозировка

2.5 mg унгвент 1-2 пъти дневно вечер и/или сутрин в зависимост от предписанието на лекаря.

Начин на приложение

Предписаната доза унгвент се прилага с помощта на градуирана спринцовка, която се завинтва за тубата с унгвента. Последната се натиска, докато спринцовката се напълни с желаното количество унгвент /според разграфената скала/, съответстващо на грамовете унгвент.

Спринцовката се отвинтва от тубата и се поставя във влагалището, като чрез натискане на буталото съдържимото се въвежда във влагалището.

Ако е необходимо канюлата се изважда от горната част на буталото и се завинтва върху противоположната страна, преди унгвента да се постави във влагалището.

Притежател на разрешението за употреба

POLICHEM S. A.

Via Calprino 18; 6900 Lugano – Paradiso

Italy

Производител

Doppel Pharmaceutici S.R.L., Sradone Farnese,

118-29100 Piacenza (PC)

"ЦСЦ Фармасютикъл - България" ЕООД,

ул. "Л. Каравелов" 10, София 1000

Лекарственият продукт трябва да се съхранява на недостъпно за деца място.

Да не се използва след изтичане срока на годност, означен върху опаковката.

