



Прочетете внимателно листовката преди да започнете да прилагате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате още въпроси, моля попитайте лекуващия си лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас и не трябва да го давате на други. То може да им навреди, дори и ако симптомите им са същите като Вашите.

Azibiot® film-coated tablets 500 mg
Азибиот филмирани таблетки 500 mg

Azithromycin
Азитромицин

ИАЛ
ОДОБРЕНО
ДАТА 11.04.06г-

Активно вещество: azithromycin

Помощни вещества: прежелатиново нишесте, кросповидон, безводен калциев хидроген фосфат, натриев лаурил сулфат, магнезиев стеарат, хидроксипропил метилцелулоза, титаниев диоксид (E171), лактозаmonoхидрат, глицеролтриацетат.

Име и адрес на производителя и притежателя на разрешението за употреба:

Krka, d.d., Novo mesto, Slovenia

1. Какво е AZIBIOT и за какво се използва?

Състав

1 филмирана таблетка съдържа 500 mg azithromycin като azithromycin dihydrate.

Опаковка

3 филмирани таблетки по 500 mg azithromycin

Какво е Azibiot?

Azibiot е антибиотик от групата на макролидите. Той се използва за лечение на бактериални инфекции.

За какво се използва Azibiot?

Azibiot се прилага за лечение на инфекции на респираторния тракт (възпаление на средното ухо, синусите, гърлото, сливиците, бронхите и белите дробове), инфекции на кожата и меките тъкани (еритема мигранс – първия етап от лаймската борелиоза, еризипел, импетиго и други вторични гнойни възпаления на кожата) и болести, предавани по полов път (не усложнени уретрити и цервиците причинени от *Chlamydia trachomatis* и не усложнена гонорея).

2. Преди употребата на AZIBIOT

Информирайте Вашия лекар, ако имате някакво хронично заболяване, метаболитно нарушение, ако сте свръхчувствителен (алергичен) или ако приемате други лекарствени продукти.

Кой не трябва да приема Azibiot?

Вие не трябва да приемате Azibiot ако сте алергичен към azithromycin, някои от помощните вещества или към други макролидни антибиотици.

Предпазни мерки и предупреждения



Кажете на Вашия лекар ако употребата на azithromycin или други макролидни антибиотици вече са ви причинили тежка алергична реакция.

Трябва да уведомите Вашия лекар и ако иматеувредена чернодробна или бъбречна функция. Вашият лекар може да реши да Ви предпише друг лекарствен продукт, ако чернодробната или бъбречната функция са значително намалени.

По време на лечение с антибиотици може да се наблюдават инфекции с нечувствителни микроорганизми (по-специално гъби) и диария. Антибиотиците могат да променят нормалната флора в червата и бактерията *Clostridium difficile*, която причинява диария да започне да се размножава. В някои случаи диарията е тежка и упорита. Консултирайте се с Вашия лекар, защото може да се наложи да спрете приемането на Azibiot заради диарията. Ако възникнат проблеми като неправилно сърцевиене, трябва да се консултирате с Вашия лекар.

Приемане на Azibiot с храна и напитки

Вие можете да приемате таблетките Azibiot независимо от храната.

Бременност

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете каквото и да било лекарство.

Няма контролирани проучвания за увреждащ ефект на Azibiot по време на бременност при хора. Тъй като безопасността по време на бременност не е доказана, лекарят ще Ви предпише Azibiot само след внимателна преценка на ползата от лечението срещу евентуалните рискове за плода.

Кърмене

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете каквото и да било лекарство.

Няма информация за отделянето на azithromycin в майчината кърма. Известно е обаче, че подобни лекарствени продукти се излъчват с майчината кърма, затова не се препоръчва да се кърми по време на лечение с azithromycin.

Влияние върху шофиране и работа с машини

Лекарственият продукт не влияе върху способността да се шофира или работи с машини.

Как другите лекарствени продукти могат да взаимодействват с Azibiot?


Моля информирайте Вашия лекар, ако страдате от каквото и да било хронично заболяване, метаболитно нарушение и ако приемате или току що сте приели някакви други лекарствени продукти, дори и такива които се отпускат без рецепт.

Антиациди: Ако приемате лекарствени продукти, които понижават стомашната киселинност заедно с Azibiot в кръвта няма да проникне достатъчно azithromycin. Затова приемайте Azibiot поне 1 час преди или 2 часа след антиацида.

Теофилин: Когато теофилин се приема едновременно с azithromycin при здрави доброволци не са наблюдавани взаимодействия. Тъй като е наблюдавано повишаване на серумната концентрация на теофилин при едновременното приемане на теофилин и някои други макролиди, Вашият лекар може да провери количеството на теофилин във Вашата кръв.

Ако приемате Azibiot едновременно с лекарства срещу съсирване на кръвта (напр. варфарин), действието на тези лекарства може да се засили и да се появят кървени. Лекарят ще провери допълнително Вашето време на кървене.

Възможно е взаимодействие между azithromycin и лекарствени продукти срещу мигрена (производни на ерго алкалоиди). Затова Вие не трябва да приемате такива лекарства по време на лечението с azithromycin.





Възможни са и взаимодействия когато макролиди се предписват едновременно с циклоспорин (лекарственият продукт се приема след трансплантиране на органи), дигоксин (лекарство за сърце), терфенадин (лекарство срещу алергия) и рифабутин (лекарство за лечение на туберкулоза).

3. Как да се използва AZIBIOT?

Дозировка и начин на приложение

Стриктно спазвайте лекарските инструкции. Вие не трябва да променяте дозировката или да прекратявате лечението без да се консултирате с Вашия лекар.

Дозировката и продължителността на лечението зависят от вида на инфекцията, мястото на инфекцията, годините на пациента и отговора от лечението.

Възрастни и деца над 45 kg приемат 500 mg azithromycin еднократно дневно в продължение на три дни. Лекарят обаче може да Ви предпише и следната схема на лечение: 500 mg azithromycin през първия ден, по 250 mg azithromycin следващите 4 дни. При лечение на Лаймска борелиоза обичайната дозировка е 1 g azithromycin през първия ден и по 500 mg azithromycin следващите 4 дни.

За лечение на болести предавани по полов път, единична доза от 1 g azithromycin е достатъчна.

Ако имате впечатление, че ефекта от лекарството е твърде слаб консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече Azibiot отколкото би трябвало:

Ако сте приели свръхдоза, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт незабавно.

Твърде високи дози могат да причинят гадене, повръщане, диария и загуба на слуха.

Ако забравите да вземете Azibiot:

Не взимайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако забравите да вземете дозата в посоченото време, трябва да я вземете веднага когато се сетите. Вземете следващата доза на следващия ден.

Ефекти, ако лечението с Azibiot се прекрати:

Трябва да приемате лекарствения продукт толкова дълго, колкото е определил лекаря. Ако прекратите лечението твърде рано, то може да не е ефективно или заболяването ви да се повтори.

4. Възможни нежелани лекарствени реакции

Както всички лекарствени продукти и Azibiot може да прояви нежелани реакции.

Наблюдавани са следните нежелани реакции: загуба на апетит, гадене, повръщане, диария (понякога тежка), болки и спазми в стомаха, газове в стомаха и червата, промяна на цвета на езика. Когато диарията е тежка и продължителна, това може да е признак за възпаление на дебелото черво (псевдомембранозен колит), който се свързва с приложението на антибиотици. Моля, консултирайте се с лекар.

Могат да се наблюдават нарушения във вкуса в резултат на използване на макролиди. При пациенти, приемали високи дози продължително време са наблюдавани преходни нарушения на слуха и шум в ушите.

Наблюдавани са по-леки алергични реакции като сърбеж, обривителна агенция, уртикария, фоточувствителност и болки в ставите. По-тежки реакции, които започват със свирене на гърдите, затруднено дишане и подуване (анафилаксия), могат също да се наблюдават. Много редки са нежеланите реакции, включващи тежки форми на кожни алергични реакции като еритема мултиформе, синдром на Stevens-Johnson и токсична епидермална некроза.



Възможни са и някои други нежелани реакции като виене на свят, главоболие, нервност, чувство на страх, сънливост, повишаване на активността на чернодробните ензими (хепатит) и жълто оцветяване на кожата, повищена уморяемост, скованост, намаляване броя на тромбоцитите (тромбоцитопения), възпаление на бъбреците или увреждане на бъбреците, неправилно сърдебиене и болка в гърдите.

Ако забележите каквито и да било нежелани реакции, дори и такива, които не са споменати в тази листовка, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт.

5. Съхранение на AZIBIOT

Условия за съхранение

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Да се съхранява под 30°C.

Срок на годност

Да не се използва след срока на годност посочен на опаковката.

Информация за предписване

Само по лекарско предписание.

Дата на последна редакция

22.01. 2002

