

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 20. 06. 06

Моля, прочетете внимателно тази листовка преди да започнете употребата на лекарствения продукт.

Запазете листовката, тъй като може да се наложи повторно да прочетете информацията написана в нея.

При наличие на въпроси или колебания, обърнете се за съвет към Вашия лекар или фармацевт.

Този лекарствен продукт е предписан лично на Вас и не трябва да го преотстъпвате на друг доктор и при подобни симптоми, тъй като може да навреди.

Xatral SR 10 mg
prolonged-release tablets

Ксатрал SR 10 mg
таблетки с удължено освобождаване

Една таблетка съдържа активното вещество alfuzosin hydrochloride 10 mg (алфузозин хидрохлорид)..

Помощните вещества: хипромелоза, хидрогенирано рициново масло, етилцелулоза, жълт железен оксид, хидратиран колоиден силициев диоксид, магнезиев стеарат, манитол, повидон, микрокристална целулоза.

Притежател на разрешението за употреба

SANOFI-AVENTIS FRANCE
1-13, boulevard Romain Rolland
75014 Paris, France

Производител

Sanofi Winthrop Industrie
Avenue Gustave Eiffel 30-36
37000 Tours
France

1. КАКЪВ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ Е XATRAL SR 10 mg, prolonged-release tablets И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА ?

Таблетки с удължено освобождаване.

АЛФА-БЛОКЕРИ

Този лекарствен продукт принадлежи към класа на алфа-блокерите.

Лечение на функционалните симптоми на доброкачествена (бенигнена) простатна хипертрофия.

Адjuвантно лечение към катетеризацията при остра ретенция на урина свързана с бенигнена простатна хипертрофия.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ XATRAL SR 10 mg, prolonged-release tablets

Да не се употребява при следните случаи:

- имате данни за свръхчувствителност към алфузозин хидрохлорид или към помощните вещества,



- страдате от ортостатична хипотония /ниско кръвно налягане, предизвикващо чувство на замайване или прилошаване при преминаване от легнало в изправено положение,
- имате чернодробно заболяване,
- имате тежка бъбречна недостатъчност,
- чревна непроходимост (поради съдържанието на рициново масло).

Специално внимание

Някои пациенти са особено чувствителни към XATRAL SR 10 mg, при които се наблюдава спадане на кръвното налягане при преминаване от легнало в седнало положение. Този ефект се наблюдава през първите няколко часа след прием на лекарствения продукт и може да се съпровожда от следните признания: замаяност, отпадналост, изпотяване.

Тези пациенти трябва да останат в легнало положение до преминаване на тези преходни симптоми.

Особено внимание се изисква при пациенти в напреднала възраст и такива, при които се забелязва спадане на кръвното налягане след прием на лекарствени продукти от същия клас (алфа-блокери).

Информирайте Вашия лекар, ако имате сърдечно заболяване.

Бременност

Това лекарство не е предназначено за употреба от жени.

Преди употреба на всеки лекарствен продукт, се консултирайте с лекар.

Кърмене

Това лекарство не е предназначено за употреба от жени.

Преди употреба на всеки лекарствен продукт, се консултирайте с лекар.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Поради риск от настъпване на ортостатична хипотония (спадане на кръвното налягане при преминаване в изправено положение и евентуална појава на световъртеж) способността за шофиране и работа с машини може да бъде повлияна отрицателно, особено в началото на лечението.

Помощни вещества с познат ефект: хидрогенирано рициново масло, манитол.

Лекарствени и други форми на взаимодействия с този лекарствен продукт ?
Информирайте Вашия лекар или фармацевт за всеки вземан от Вас лекарствен продукт, особено лекарствени продукти за високо кръвно налягане.

3. КАК ТРЯБВА ДА ПРИЕМАТЕ XATRAL SR 10 mg, prolonged-release tablets

Перолано приложение.

Дозата е 1 таблетка Xatral SR 10 mg дневно, след вечеря.

Приемайте таблетките цели с обилно количество вода.

Таблетката се погъща цяла, без да се сдъвква, чупи или раздробява.



В случай на катетеризация, таблетката се приема от първия ден на поставяне на катетъра.

Ако считате, че ефектът от лечението с Xatral 10 mg е прекалено силен или слаб, трябва да се консултирате с лекуващия лекар.

Какво трябва да направите, ако сте приели повече таблетки ?

Консултирайте се незабавно с Вашия лекар или позвънете на Бърза помощ.

Какво трябва да направите ако сте пропуснали една или повече дози ?

Ако сте забравили да вземете таблетката, следващия път не приемайте двойна доза. Пропуснете приема и продължете лечението с прием на обичайната дозировка взета по обичайното време.

4. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Както всички други лекарствени продукти и **XATRAL SR 10 mg, prolonged-release tablets** може да предизвика появата на нежелани лекарствени реакции.

Най-честите лекарствени реакции са :

- замайване, общо чувство на дискомфорт, слабост, главоболие,
- стомашни неразположения като гадене, болка в стомаха,
- изтощение.

Нечести лекарствени реакции:

- замаянаст, сънливост;
- понижаване на кръвното налягане при изправяне от легнало в седнало положение;
- ускорен сърдечен ритъм, палпитации, синкоп;
- разстройство, сухота в устата;
- кожни реакции като обриви и сърбежи;
- зачеряване на лицето, оток, болка в гърдите.

Информирайте Вашия лекар при настъпване на други нежелани лекарствени реакции, различни от описаните или, ако общото Ви състояние се е влошило по време на употреба на това лекарство.

5. НАЧИН НА СЪХРАНЕНИЕ

Няма специални условия на съхранение.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да не се употребява след изтичане срока на годност, обозначен върху опаковката.

Дата на последна редакция на текста
Януари 2006

