

И А Л,
ОДОБРЕНО!
ДАТА 07.06.2004г.

Указания за употреба

Моля, прочетете внимателно тези указания за употреба, тъй като те съдържат важна за Вас информация.

Това лекарство може да бъде закупено и без рецепт. За постигане на оптимален терапевтичен успех обаче, Bronchicum Pastillen трябва да се приема съгласно указанията.

- Запазете листовката приложена в опаковката, възможно е в по-късен момент да пожелаете да я прочетете отново.
- За всяка вид допълнителна информация или съвет, моля консултирайте се със своя фармацевт.
- В случай, че състоянието Ви се влоши или нямате подобрене след 5 дни, моля консултирайте се със своя лекар.

Bronchicum Pastillen

Бронхикум Пастили

Активно вещество:

Thymi extr. fluidum (Течен екстракт от мащерка).

1 пастил съдържа: Thymi extr fluidum (течен екстракт от мащерка) (1: 2-2,5) 100 mg

Разтвор за извлечане: амонячен разтвор 10% : глицерол : етанол 90 % (V/V): вода (1 : 20 : 70 : 109)

Помощни вещества: захароза; поливидон; ментол;
цинеол; силициев диоксид, колоиден безводен; магнезиев стеарат
(Ph.Eur); арабска гума .

Оригинални опаковки с 20 и 50 пастили.



1. Какво представлява Бронхикум Пастили и в какви случаи се използва това лекарство?

Бронхикум Пастили е лекарство от растителен произход.

Притежател на разрешението за употреба:

Aventis Pharma Deutschland GmbH, D65926 Frankfurt am Main, Germany

Производител:

Aventis Pharma-Nattermann & Cie. GmbH, Nattermannallee 1, D 50829 Köln, Germany

Бронхикум Пастили се прилага за подпомагане на муколизата (втечняване на секретите) в дихателните пътища и откашлянето.

Тази информация се основава на дългогодишен опит.

При треска, задух и ако оплакванията са неясни или продължават повече от 5 дни, моля консултирайте се с Вашия лекар.

2. Какво трябва да имате предвид преди да приемете Бронхикум Пастили?

Продуктът не трябва да се приема при данни за свръхчувствителност (алергия) към мащерка или някое от помощните вещества.

Поради липса на достатъчно изследвания, Бронхикум Пастили не трябва да се използва от бременни жени, по време на кърмеме или от деца под 6 годишна възраст.

При пациенти със захарен диабет трябва да се вземе под внимание съдържанието на захароза в пастилите – 816 mg / пастил.

Взаимодействия с други лекарства

Не са известни.



Моля, уведомете своя лекар или фармацевт ако приемате, или насърко сте приемали други лекарства, дори и ако са такива, отпусканни без рецепт.

3. Как трябва да се приема Бронхикум Пастили?

Моля, приемайте Бронхикум Пастили винаги точно по указанията в тази листовка. Моля, говорете с Вашия лекар или аптекар, когато възникнат въпроси или колебания.

Оставете Бронхикум Пастили да се разтвори бавно в устата.

Ако не е предписано друго от лекар, е подходяща следната дозова схема:

1-2 пастили се смучат бавно до пет пъти дневно.

Доколкото е възможно, разпределете приема на пастилите на равни интервали през деня.

Продължителността на приемане не е ограничена, но моля, вземете под внимание информацията дадена в раздел 1.

Симптоми на интоксикация (отравяне) с Брохикум Пастили могат да се изключват напълно.

Ако сте пропуснали прием, продължете да вземате лекарството по обичайния начин.

4. Какви нежелани реакции могат да възникнат?

Както всички лекарства и Бронхикум Пастили е възможно да предизвика нежелани реакции. При оценката на нежеланите лекарствени реакции са взети следните:

Много често—повече от 1 на 10 пациента

Често—повече от 1 на 100 пациента

Рядко—повече от 1 на 1000 пациента



Рядко в отделни случаи–повече от 1 на 10 000 пациента

Много рядко–1 или по-малко на 10 000 пациента или изолирани случаи

В отделни много редки случаи могат да се появят алергични кожни реакции като кожен обрив или копривен обрив (екзантема, уртикария), както подуване на лицето, в устата и/или фарингеалното пространство (едем на Квинке).

В такъв случай, моля, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, така че да се предприемат необходимите мерки. Моля, информирайте своя лекар или аптекар, ако забележите някакви нежелани лекарствени реакции, които не са описани в листовката. В случай на нежелана лекарствена реакция, преустановете приемането на лекарството и се посъветвайте с Вашия лекар.

5. Как трябва да се съхранява Бронхикум Пастили?

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Да се съхранява при температура до 25°C.

Бронхикум Пастили не трябва да се използва след изтичане срока на годност, означен върху картонената кутия или върху блистера.

Забележка

Поради наличието на съставки от растителен произход видът на повърхността на пастила може да се промени. Това не оказва влияние върху качеството или безопасността на продукта.

Указание за диабетици

1 пастил отговаря на 0,07 ХЕ (хлебни единици).

Дата на актуализация на текста–май 2002

