

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 10.05.05

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

BONVIVA/БОНВИВА

2.5 mg film coated tablets / 2.5 мг филмирани таблетки
Ibandronic acid / ибандронова киселина

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате други въпроси, моля, запитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично за Вас и не трябва да го давате на други хора. То може да бъде вредно за тях, даже и ако техните симптоми са същите като Вашите.

В тази листовка:

1. Какво представлява BONVIVA и за какво се използва
2. Преди да използвате BONVIVA
3. Как да се прилага BONVIVA
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на BONVIVA.
6. Допълнителна информация

BONVIVA

Лекарственото вещество е ibandronic acid (ибандронова киселина). Всяка филмирана таблетка съдържа 2,5 mg ибандронова киселина под формата на натриева солmonoхидрат.

Другите съставки са:

сърцевина на таблетката: монохидратна лактоза, повидон, микрокристална целулоза, кросповидон, пречистена стеаринова киселина, безводен колоидален силициев диоксид .

обвивка на таблетката: хипромелоза, титаниев диоксид, талк, макрогол 6000


Притежател на разрешението за употреба:

F.Hoffmann-La Roche Ltd., Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Switzerland

Производител, отговорен за освобождаване на партидите:

1.F.Hoffmann-La Roche Ltd., Grenzachrstrasse 124, 4070 Basel, Switzerland

2.F.Hoffmann- La Roche AG
Emil-Barell-Str. 1
D-79639 Grenzach-Whylen
Germany



1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА BONVIVA И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

BONVIVA принадлежи към групата лекарства, наречени **бифосфонати**. Лекарството не съдържа хормони.

BONVIVA се произвежда в опаковки по 28 и 84 филмирани таблетки. Те са бели до кремави на цвят с овална форма. Не всички размери опаковки може да се продават.

BONVIVA се предписва за лечение или за профилактика на остеопороза. Остеопорозата представлява изтъняване и намаляване на здравината на костите. Тя е честа при жени след менопауза. В менопаузата яйчниците престават да произвеждат женския хормон естроген, който помага за запазване здравината на скелета на жената.

Колкото по-рано жената влезе в менопауза, толкова по-голям е рисъкът от остеопороза. Други фактори, които увеличават риска включват:

- недостатъчно количество калций и витамин D в диетата
- тютюнопушене или консумацията на твърде много алкохол
- недостатъчно ходене или други натоварващи физически усилия
- наличие на случаи на остеопороза в семейството.

Много пациентки с остеопороза нямат симптоми. Ако нямате симптоми, вие може да не знаете, че страдате от това заболяване. Остеопорозата обаче ви прави по склонни към счупване на кост, когато паднете или се контузите. Счупена кост след 50-годишна възраст може да бъде признак на остеопороза. Остеопорозата може да бъде също причина за болки в гърба, намаление на ръста или изгърбане.


BONVIVA предотвратява загубата на костно вещество вследствие на остеопороза и помага за изграждане на костта отново. Поради това BONVIVA прави костите по-малко податливи на счупване.

Здравословният начин на живот също ще ви помогне да получите максимална полза от лечението. Това включва балансирана диета, богата на калций и витамин D, ходене или други натоварващи физически усилия и избягване на пушенето и консумацията на твърде много алкохол.

2. ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕТЕ BONVIVA

Не вземайте BONVIVA:

- Ако в миналото сте имали алергична реакция към ибандроновата киселина или към някоя от другите съставки на BONVIVA.
- Ако имате или считате, че можете да имате **ниски стойности на калций в кръвта**.
- Ако сте бременна или мислите, че можете да сте бременна, или ако кърмите.



Не давайте BONVIVA на деца или на младежи.

Като вземате BONVIVA, обрнете специално внимание:

Някои хора трябва да са особено внимателни, докато вземат BONVIVA. Кажете на лекуващия си лекар:

- Ако имате **нарушения на обмяната на минералите (като недостиг на витамин D).**
- Ако не можете да стойте или седите изправени в продължение на 1 час.
- Ако бъбреците ви не функционират нормално.

Ако някога сте имали проблеми с хранопровода (търбата, която съединява устата със stomаха). Проблемите в хранопровода може да се проявят със симптоми, включващи силна болка в гърдите, силна болка при прегълдане на храна и/или напитка, силно изразено гадене, повръщане. Ако развиете тези симптоми, незабавно говорете с лекуващия си лекар.

Не приемайте BONVIVA с храна и напитки:

Ефективността на BONVIVA е по-малка, когато лекарството се приема с храна (виж раздел 3. КАК ДА СЕ ПРИЕМА BONVIVA).

Ако сте бременна или кърмите

Не използвайте BONVIVA, ако сте бременна или кърмите. Ако кърмите, може да се наложи да преустановите кърменето, за да вземате BONVIVA.

Вие може да шофирате и да работите с машини

Много малко вероятно е BONVIVA да повлияе способността ви за шофиране или работа с машини.

Прием на други лекарства с BONVIVA:

Моля, информирайте Вашия лекуващ лекар или фармацевта, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства. Споменете всичко, което сте си купили сами без рецепт, както и хранителните добавки, съдържащи калций, магнезий, желязо или алуминий.

Аспирин и други нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) може да предизвикат дразнене на stomаха и червата. Бифосфонатите (като BONVIVA) може да направят същото. Така че трябва да внимавате особено, ако вземате **болкоуспокояващи или противовъзпалителни лекарства**, докато се лекувате с BONVIVA (НСПВС включват ибупрофен, диклофенак натрий и напроксен).

След погълдането на таблетка BONVIVA, изчакайте 1 час преди да вземете **някакви други лекарства**, включително и таблетки или лекарство против лошо храносмилане, калциеви добавки или витамини.

3. КАК ДА СЕ ВЗЕМА BONVIVA

Винаги вземайте BONVIVA точно както лекуващият ви лекар ви е казал. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте лекуващия си лекар или фармацевта.

Обичайната доза BONVIVA е една таблетка дневно.

Като вземате ежедневно таблетката

Важно е да следвате стриктно тези указания. Те имат за цел да помогнат таблетката BONVIVA да достигне стомаха ви бързо, така че да се намали възможността за дразнене на хранопровода ви:

- Вземете таблетката BONVIVA **поне 6 часа след като сте ханали или пили нещо с изключение на вода.**
- Вземете таблетката BONVIVA
 - **след като станете сутрин и**
 - **преди да сте ханали или пили нещо** (на гладен стомах)
- Прегълтнете таблетката **с пълна чаша чиста вода** (не по-малко от 200 мл). Не вземайте таблетката с минерална вода, плодов сок или някаква друга напитка.
- Прегълтнете таблетката **цяла** - не я дъвчете, не я размачквайте и не позволявайте тя да се разтвори в устата ви.
- **През следващия час (60 минути)** след като сте взели таблетката
 - **не лягайте.** Ако не сте в изправено положение (права или седнала), част от лекарството може да се върне в хранопровода ви
 - **не яхте нищо**
 - **не пийте нищо** (с изключение на чиста вода, ако имате нужда)
 - **не вземайте друго лекарство.**
- След като сте изчакали един час, можете да приемете първата храна и напитка за деня. След като сте се нахранили, можете да легнете, ако желаете, и да вземете друго лекарство, ако имате нужда.

Не вземайте таблетката преди лягане или преди да станете сутрин.

Продължавайте да вземате BONVIVA

Важно е да продължавате да вземате BONVIVA всеки ден - толкова, колкото лекуващият ви лекар ви е предписал. BONVIVA може да лекува или предпазва от остеопороза само докато продължавате да вземате таблетките.

Ако сте взели повече BONVIVA, отколкото е необходимо:

Ако по погрешка вземете твърде много таблетки, **изпийте пълна чаша мляко и незабавно се свържете с лекуващия си лекар.**

Не предизвиквайте повръщане и не лягайте – това може да доведе до увреждане на хранопровода от BONVIVA.

Ако забравите да вземете BONVIVA:

Ако пропуснете една или повече дози, **не вземайте допълнително таблетки за компенсация и не вземайте таблетката по-късно през деня.**

Просто вземете обичайната си доза, когато станете на следващия ден.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ



Както всички лекарства, BONVIVA може да предизвика нежелани реакции. Не всеки обаче ги получава.

Най-честите нежелани ефекти са киселини, нарушен храносмилане и диария.

Другите възможни нежелани ефекти включват обрив, болка в мускулите и ставите.

Ако получите тези ефекти, те обикновено изчезват с продължаване на приема на BONVIVA. Така че вие трябва да можете да продължите да го вземате. Говорете с лекувания си лекар, ако някой от тези ефекти стане неприятен или продължи дълго време.

BONVIVA може да дразни хранопровода, въпреки че вие обикновено можете да избегнете това, като вземате дозата си по описания в тази листовка начин.

Ако развиете симптоми като **силна болка в гърдите, силна болка след прегълдане на храна или напитка, силно гадене или повръщане**, веднага кажете на лекувания си лекар.

Ако забележите някаква нежелана реакция, която не е спомената в тази листовка, моля, съобщете на Вапния лекуващ лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА BONVIVA

Съхранявайте BONVIVA на място, където децата не могат да го стигнат и да го видят.

Да не се съхранява при температура над 30°C.

BONVIVA се съхранява в оригиналната си опаковка. Не изваждайте таблетките от тяхната опаковка, докато не сте готови да ги приемете.

Не използвайте BONVIVA след датата на изтичане на годността, отбелязана на външната опаковка.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Ако имате допълнителни въпроси относно приема на таблетките BONVIVA, моля попитайте лекувания си лекар или фармацевт.

За информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с местния представител на притежателя на разрешението за употреба.

