

ИАЛ  
ОДОБРЕН ОI  
ДАТА 20.06.06

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

### KLERIMED

**Моля, прочетете внимателно тази листовка преди започване на лечението с Klerimed. Тази листовка Ви дава само обобщение на информацията, която е налична за вашия лекарствен продукт. Ако не сте сигурен за нещо или имате някакви въпроси, попитайте вашия лекар или фармацевт.**

### КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА ПРОДУКТА

Наименованието на вашия лекарствен продукт е Klerimed (Клеримед). Всяка филмирана таблетка съдържа като лекарствено вещество 250mg или 500mg от clarithromycin. Помощните вещества на филмираните таблетки са: натриева кроскармелоза, микрокристалинна целулоза, силициев диоксид, магнезиев стеарат, повидон, стеаринова киселина, талк, хипромелоза, пропилен гликол, сорбитанов олеат, ванилия, квинолиново жълто (Е 104), титаниев диоксид (Е171), хидроксипропил целулоза, сорбина киселина.

Филмираните таблетки от 250mg и 500mg са с овална форма и жъlt цвят. Филмираните таблетки от 250mg имат издълбана линия от едната страна.

Филмираните таблетки Klerimed са налични в кутии с по 14 броя таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и производител на Klerimed е:

Medochemie Ltd, p.o box 51409, Limassol, CY-3505, Cyprus.

Clarithromycin е антибиотик, спадащ към групата, наречена макролиди. Антибиотиците потискат растежа на бактериите, причиняващи инфекция. Klerimed се използва за лечение на различни инфекции, като:

- Инфекции на гръденния кош (като бронхити или пневмонии)
- Инфекции на гърлото и синусите
- Инфекции на кожата и меките тъкани



- Инфекции с *Helicobacter pylori* (те се свързват с предизвикване на язва на дванадесетопръстника)

Лекарят ще ви каже за какво ще се лекувате.

## **ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С KLERIMED**

Вие трябва да разговаряте с лекаря преди започване на лечение с Klerimed, ако някое от следните неща се отнася за вас:

- Някога сте имали алергична реакция (като сърбеж или кожен обрив) към clarithromycin или към някое от помощните вещества на филмираната таблетка (те са изредени по-горе). Също, ако някога сте имали алергична реакция след вземане на антибиотици като азитромицин или еритромицин, тъй като те преинадлежат към групата на макролидните антибиотици.
  - Вие сте, или може да сте, бременна
  - Вие кърмите
  - Вие имате или някога сте имали бъбречно заболяване
- Филмираните таблетки Klerimed не са подходящи за деца под 12 годишна възраст. На тази група пациенти трябва да се прилага перорална суспенсия clarithromycin.

Кажете на лекаря си, ако приемате някой от тези лекарствени продукти:

- Дигоксин (лекарство за сърцето)
- Варфарин (лаекарство за разреждане на кръвта)
- Карбамазепин (за лечение на епилепсия)
- Теофилин (за астма или кашлица)
- Зидовудин (за лечение на някои инфекции)
- Лекарства за мигрена, които съдържат ерготамин или дихидроерготамин
- Лекарства за лечение на алергии, които съдържат астемизол или терфенадин

Кажете на лекаря си за всички лекарства, които вземате, включително и тези без лекарско предписание.

## **ЛЕЧЕНИЕ С KLERIMED**

Таблетките Klerimed трябва да се поглъщат цели с вода.

Лекарят ще ви каже кога и колко таблетки Klerimed да вземате. Винаги следвайте назначенията му. Инструкциите трябва да са на опаковката. Винаги я четете и спазвайте дадените инструкции. Ако не сте сигурен, попитайте лекаря или фармацевта.

За възрастни и деца над 12 годишна възраст, обичайната доза е една таблетка от 250mg Klerimed, два пъти дневно (една сутринта и една вечерта). Обичайната продължителност на лечение е 7 дни. В случай на тежка инфекция лекарят може да удвои дозата.

Не спирайте приема на Klerimed, поради това че сте се почувствали по-добре. Важно е, да приемате лекарството си, толкова дълго, колкото лекарят ви е казал, в противен случай инфекцията може да се възстанови.

Klerimed е част от лечението на инфекции от *Helicobacter pylori*. В повечето случаи, ще ви се каже да вземате заедно с Klerimed, омепразол (за stomаха) и амоксицилин (друг антибиотик). Има различни комбинации за лечение на тази инфекция. Лекарят ще реши коя от тези комбинации е най-добра за вас и продължителността на лечението. В повечето случаи, дозата на clarithromycin е 500mg два пъти дневно; лечението продължава за две седмици.

Ако забравите да вземете таблетките, когато трябва, приемете ги когато си спомните. Ако времето за следващата доза е наблизило, чакайте дотогава и вземете тази доза, не вземайте две дози едновременно.

Ако случайно сте взели повече таблетки, отколкото трябва, свържете се с лекаря или фармацевта веднага. Ако не можете, отидете в най-близката болница. Винаги носете лекарството със себе си, така че да знаят какво сте взели.

## СЛЕД ЛЕЧЕНИЕ С KLERIMED

Както с всички лекарства, някои хора понякога имат нежелани реакции с Klerimed, като гадене или повръщане, или болка в корема. Ако по време на лечение с Klerimed имате



продължителна, тежка диария, спрете приема на лекарството и се консултирайте незабавно с лекаря.

Докато вземате Klerimed, стойностите на някои чернодробни ензими могат да се повишат. Тези нива ще се върнат към нормата след края на лечението. Много рядко някои хора по време на лечение с Klerimed развиват нарушения на жълчния мехур или черния дроб. Ако се почувстувате общо неразположен или забележите, че очите са ви пожълтели, урината ви е тъмна или изпражненията ви са светли, веднага се консултирайте с лекаря. Някои хора, докато приемат Klerimed, забелязват странен вкус в устата си. Също езикът им може да потъмне. Не се тревожете. Няма нужда да спирате лечението поради тези симптоми.

Както с всички лекарства, някои хора могат да имат алергични реакции след прием на clarithromycin. Ако чувствате затруднения в дишането или забелязвате кожен обрив, или отоци на устните или лицето, спрете приема на лекарството и незабавно се консултирайте с лекаря или болница.

Ако някоя от горепосочените нежелани реакции е тежка или вие се тревожите за нея, поговорете с лекаря или фармацевта. Не се притеснявате за списъка възможни нежелани реакции, Вие може да нямаете никоя от тях.

Ако имате някоя друга реакция, която смятате за свързана с Klerimed, кажете на лекаря или фармацевта.


## **КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО**

Съхранявайте таблетките на сухо място, защитено от светлина, на температура под 30°C.

Съхранявайте таблетките в оригиналната опаковка.

Пазете таблетките, където деца не могат да го видят или достигнат.

Не използвайте таблетките след изтичане на срока на годност. Той е на опаковката. Има го също на всеки блистер с таблетки.



## **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Пълната информация за Klerimed не е в тази листовка. Ако искате да знаете повече или имате някакви въпроси, попитайте вашия лекар или фармацевт.  
Помните, лекарят ви е назначил това лекарство на ВАС. Никога не го давайте на някой друг.

Дата на изготвяне на листовката: 12.2001

“Klerimed” е търговска марка

Информацията в тази листовка е само за “Klerimed”

