

ПРЕДИ УПОТРЕБА, МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЛИСТОВКАТА

AULIN 100

АУЛИН 100

NIMESULIDE

НИМЕЗУЛИД 100 МГ.

Името на Вашето лекарство е Аулин. То принадлежи към групата на нестероидните противовъзпалителни средства, изписвани обикновено при болки, схващания и възпаления.

Аулин съществува под две форми, таблетки и гранули. Всяка таблетка или пакетче гранули съдържа 100 мг. активно вещество Нимезулид и следните неактивни вещества:

Аулин таблетки

Натриев докузат, хидроксипропилцелулоза, лактоза, натриева гликоскорбяла микрокристална целулоза, хидрогенирано растително масло, магнезиев стеарат.

Аулин гранули

Кетомакрогол 1000
малтодекстрин, лимонена киселина портокалов аромат, 1,8 захар.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РЕГИСТРАЦИЯТА И ПРОИЗВОДИТЕЛ:

Хелзин Бирекс Фармасютикълс ЛТД,
Сандифорд Индустриал Истеит,
Дъблин 18

Аулин може да се предписва за лечение на болка и възпаления при навяхване и изкълчване, болезнени състояния, засягащи стави и мускули, зъбна болка и дисменорея (болка по време на цикъл).

ПРЕДИ ДА ИЗПИЕТЕ ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО

- *Страгате ли от активна язва на стомаха или дванадесетопръстника или от стомашно-чревно кървене? Имате ли данни за язвени рецидиви?*

- Получавали ли сте някога алергична реакция, кожни обриви или хрипове след прием на аспирин или други противо- възпалителни лекарства?
- Имате ли известна алергия към нимезулид (Аулин)?
- Страдате ли от заболявания на бъбреците или черния дроб?
- Имате ли нарушения в кръвосъсирването?

Ако отговорът на някои от тези въпроси е ДА, не приемайте Аулин преди да се посъветвате с Вашия лекар отново.

- Имали ли сте някога стомашна язва?
- Страдате ли от язвен колит или от болестта на Крон?
- Страдате ли от сърдечно заболяване?
- Подлаган ли сте скоро на операция или друга хирургична намеса?

Ако отговорът на някои от тези въпроси е Да, Вие трябва да информирате Вашия лекар.

Ако Вие приемате лекарства, повлияващи кръвосъсирването (антикоагуланти, аспирин или други салицилати), някои лекарства за контрол на кръвното налягане (диуретици), или лекарства за диабетици (толбутамид), проверете с Вашия лекар дали Аулин може да им повлияе.

Ако сте бременна или кърмите, трябва да кажете на Вашия лекар преди да започнете да приемате Аулин.

Не се препоръчва употребата на Аулин от деца.

КАТО ВЗЕМЕТЕ ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО

Следвайте предписанията на Вашия лекар как и кога да приемате Вашето лекарство и моля, прочетете внимателно листовката.

АУЛИН таблетки трябва да се поглъщат цели с течност след ядене.

АУЛИН гранули: изсипете съдържанието на едно прахче Аулин гранули в 80 мл вода, приблизително 1/3 от съдържанието на една пълна чаша и го изпийте веднага.

Нормалната доза е една таблетка или прахче, два пъти дневно, обикновено сутрин и вечер. Вашият лекар може да реши да повиши до две таблетки или прахчета два пъти дневно, при необходимост. Вашият лекар или фармацевт могат да Ви помогнат, ако не сте сигурни за дозата.

Не се препоръчва лечението с Аулин да продължава дълго. Обикновено лечението с Аулин продължава от 1 до 15 дни.

Ако Вие случайно изпиете много таблетки или прахчета, кажете на Вашия лекар веднага или идете в спешното отделение на най-близката болница.

Ако забравите да си вземете дозата, оставете напълно и вземете следващата доза, ако е необходимо.

СЛЕД КАТО ИЗПИЕТЕ ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО

При повечето хора Аулин не причинява странични реакции. Понякога, у някои хора може да предизвика нежелани ефекти- стомашни оплаквания като гадене, парене, стомашна болка. Тези прояви обикновено са слаби и бързо отзвучават. Други проблеми, наблюдавани понякога с Аулин, са кожни обриви, главоболие и виене на свят. Вие трябва да информирате Вашия лекар или фармацевт, ако развиете някакви нежелани симптоми или проблеми, докато приемате това лекарство.

СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШЕТО ЛЕКАРСТВО

Аулин трябва да се съхранява под 25С на сухо място, далеч от обсега на деца. Не употребявайте Аулин след изтичане на срока на годност, отпечатан върху картонената опаковка и върху блистера или отделните прахчета.

Помнете, че това лекарство е за Вас. Само лекар може да Ви го предпише. Никога не го давайте на други. То може да не е подходящо за тях, дори и да имат симптоми, подобни на Вашите.

Листовката е подготвена: Януари 1995

Аулин таблетки 100 мг РА 294/18/1

Аулин гранули 100 мг РА 294/18/2

HELSINN birex

CSC Pharmaceuticals Ltd. - Bulgaria

София 1000, ул. „Любен Каравелов“ 10

тел./факс: 81 53 76