

ИАЛ  
ОДОБРЕНО!

ДАТА 07.08.07

## NUROFEN LIQUID CAPSULES

Ibuprofen 200mg

### НУРОФЕН ЛИКВИД КАПСУЛИ

Моля, прочетете внимателно листовката, преди да започнете да ползвате лекарствения продукт. Запазете я, може да пожелаете да я прочетете отново.

#### Какво се съдържа в Нурофен Ликвид Капсули?

Всяка таблетка съдържа: активната съставка ибупрофен 200mg и следните помощни вещества: полиетилен гликол, витамин Е, повидон, желатин, течен малтитол, сорбитол, пречистена вода, опакод, оцветител Е 124.

Опаковка Нурофен Ликвид капсули съдържа 10 капсули.

#### Какъв лекарствен продукт е Нурофен Ликвид Капсули и за какво служи?

Нурофен Ликвид съдържа 200mg ибупрофен, който принадлежи към групата на нестероидните противовъзпалителни лекарствени продукти. Те водят до облекчение на симптомите, като променят отговора на организма към болка, имат противовъзпалителен ефект и понижават високата температура.

Нурофен Ликвид е показан за симптоматично лечение на лека до умерена болка от различен произход, като главоболие, болки в гърба, мигрена, зъбобол, невралгия, менструални болки, ревматични и мускулни болки, както и за облекчение на симптомите при простуда и грип, съпроводени с температура.

Нурофен Ликвид капсули се отпуска без лекарско предписание.

#### Прочетете листовката внимателно преди да започнете да взимате Нурофен Ликвид Капсули:

Не трябва да приемате Нурофен Ликвид капсули ако:

- сте алергични към ацетилсалицилова киселина, ибупрофен или към някоя от съставките на лекарствения продукт
- имате астма, алергични обриви или сърбежи, появява се алергична хрема, когато взимате ибупрофен, ацетилсалицилова киселина или подобни на тях лекарствени продукти
- имате или сте имали язва на стомаха или дванадесетопръстника
- сте в последния триместър на бременността
- вашата възраст е под 12 години

#### Предупреждения:

Лекарства като Нурофен Ликвид Капсули могат да бъдат свързани с леко увеличен риск от сърдечен инцидент („миокарден инфаркт“) или инсулт. Всеки риск е по-вероятен при високи дози и при продължително лечение. Не превишавайте препоръчаните дози и продължителността на лечението 3 дни.



Ако имате проблеми със сърцето, прекаран инсулт или мислите, че за Вас може да има риск от появата им (например ако имате високо кръвно налягане, диабет, повишени стойности на холестерол или сте пушач) трябва да обсъдите лечението с Вашия лекар или фармацевт.

**Консултирайте се с вашия лекар преди да започнете да взимате Нурофен Ликвид Капсули ако:**

- имате астма, бъбречни, сърдечни или чернодробни проблеми
- имате системен лупус еритематозус или друго смесено съединително-тъканно заболяване
- редовно приемате други лекарствени продукти, особено ако това са:
  - други облекчаващи болката лекарствени продукти, съдържащи ацетилсалицилова киселина, ибупрофен или други от групата на нестероидните противовъзпалителни лекарствени продукти
  - лекарствени продукти за високо кръвно налягане, включително и диуретици
  - лекарствени продукти за разреждане на кръвта (антикоагуланти)
  - метотрексат или лекарствени продукти, съдържащи литий
  - зидовудин
- бременни сте или кърмите
- трябва да ограничите приема на калий

Ако Ви е известно, че страдате от непоносимост към някои захари, консултирайте се с Вашия лекар преди да започнете приема на този лекарствен продукт.

Има данни за единични случаи при употреба на нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти, прилагани продължително и при по-високи дози, които могат да повлияят временно и обратимо възможността за забременяване.

**Как да взимате Нурофен Ликвид Капсули?**

За възрастни и деца над 12 години:

Първоначално се приемат 1-2 капсули с вода, след това ако е необходимо се вземат 1 или 2 капсули на всеки 4 часа, но не повече от 6 капсули за 24 часа.

Капсулата се поглъща цяла без да се дъвче.

Не е подходящ за деца под 12 години.

**Докато приемате Нурофен Ликвид Капсули:**

Ако сгрешите и приемете повече капсули от посочената доза, незабавно се свържете с лекар.

Ако симптомите продължат повече от 3 дни и болката и температурата не се повлияват или се появят нови симптоми, консултирайте се с лекар или фармацевт.

**Нежелани реакции:**

Нурофен Ликвид Капсули има добра поносимост и се приема много добре от повечето хора. В отделни случаи могат да се появят следните нежелани лекарствени реакции: стомашен дискомфорт и болка, гадене, стомашна язва.



оцветени в черно изпражнения, влошаване на астматични пристъпи, затруднено дишане, бъбречни или чернодробни проблеми, главоболие, замайване и смущения в слуха, много рядко кожни обриви, сърбежи, лющене на кожата, склонност към лесно получаване на синини, подпухналост на лицето.

Ако се появят някой от тези нежелани лекарствени реакции или други необичайни симптоми, спрете да взимате лекарствения продукт и незабавно се консултирайте с лекар.

Лекарства като Нурофен Ликвид Капсули могат да бъдат свързани с леко повишен риск от сърдечен инцидент („миокарден инфаркт“) или инсулт.

**Как да се съхранява лекарствения продукт?**

Да не се използва след датата, посочена на опаковката.

Да се съхранява под 25°C, в оригиналната опаковка.

**Запомнете: Да се съхранява на място, недостъпно за деца.**

**Как можете да получите повече информация за Нурофен Ликвид Капсули?**

Листовката дава най-важната информация на пациента за Нурофен Ликвид капсули. Ако имате повече въпроси след прочитането ѝ, попитайте вашия лекар или фармацевт, те ще ви дадат допълнителна информация.

**Притежател на разрешението за употреба:**

**Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.**

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH

Великобритания

**Производител:**

**Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.**

Nottingham Site, Thane Road, Nottingham, NG90 2DB

Великобритания

Дата на ревизия на текста: март, 2007

