

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

КАЛИЕВ ЙОДИД УНИМЕД ФАРМА 2 %
Капки за очи, разтвор
Калиев йодид

Листовка - Приложение 2

Към РУ №: 11-3451, 12.11.08

Одобрено: 16/15.04.08

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лека, или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като вашите.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Калиев йодид Унимед Фарма 2% и за какво се използва
2. Преди да приемете Калиев йодид Унимед Фарма 2%
3. Как да приемате Калиев йодид Унимед Фарма 2%
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Калиев йодид Унимед Фарма 2%
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КАЛИЕВ ЙОДИД УНИМЕД ФАРМА 2% И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА


Активното вещество: микродоза йод – оказва влияние върху белтъчния и липидния обмен. Локалното прилагане на йод и йодни препарати забавя помътняването на лещата и намалението на остротата на зрението при начална старческа катаракта.

Калиев йодид подпомага метаболитните и резорбционни процеси в окото при катаракта (перде) от различно естество; резорбцията на ексудат при възпалителни процеси и на кръв от стъкловидното тяло; при артериосклеротични промени на съдове на ретината и увеята; при дегенеративни процеси на ретината при късогледство, катаракти в начален стадий, паренхиматозни кератити (роговични мътнини).

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КАЛИЕВ ЙОДИД УНИМЕД ФАРМА 2%

Не използвайте Калиев йодид Унимед Фарма 2% при:

- ако сте алергични към активното вещество, или към някоя от останалите съставки
- бременност и кърмене
- хронична пиодермия на кожата на лицето
- хеморагична диатеза
- функционални нарушения на щитовидната жлеза
- новородени



Обърнете специално внимание при употребата на Калиев йодид Унимед Фарма 2%

По време на използване на лекарствения продукт не се позволява носенето на меки контактни лещи. Твърдите контактни лещи трябва да се свалят и да се поставят отново най-рано 30 минути след прилагането на продукта.

Прием на други лекарства

Калиев йодид Унимед Фарма 2% може да взаимодейства с други, предписани по същото време лекарствени продукти, затова моля, информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Ако използвате други лекарствени продукти за очи, консултирайте се с офталмолог за тяхното приложение.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Калиев йодид Унимед Фарма 2% е противопоказан по време на бременност и кърмене

Шофиране и работа с машини

Веднага след употреба на продукта е възможна поява на замъглено зрение, което може да затрудни шофирането и работата с машини.

Затова се препоръчва извършването на такива действия да става най-рано 15 минути след прилагането на продукта.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КАЛИЕВ ЙОДИД УНИМЕД ФАРМА 2%

Винаги използвайте Калиев йодид Унимед Фарма 2% точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Точната дозировка и продължителността на приемане на продукта се определят от лекуващия лекар. Обикновено по 1-2 капки 2-4 пъти дневно се капват в очната конюнктивна торбичка.

При спазване на начина на употреба, предозирането е практически невъзможно.

При случайно поглъщане от дете се посъветвайте с лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.


4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Калиев йодид Унимед Фарма 2% може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Продуктът обикновено се приема добре. Непосредствено след прилагането може да се усети слабо парене.

След дълго неконтролирано приложение (при приложение на повече от необходимата доза) при чувствителни пациенти може да доведе до така наречения „йодизъм”. Той се проявява с дразнене на конюнктивата и изпълването ѝ с кръв, с повишена секреция на слъзи, замъглено виждане, парене и болка. Възможно е да се стигне до оток на клепачите (едем на Квинке) и едем на слъзните жлези. По кожата могат да се появят зачервяване, дерматит и пурпура.

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.



5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ КАЛИЕВ ЙОДИД УНИМЕД ФАРМА 2%

Съхранявайте при температура под 25° С.

Пазете от светлина.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте след срока на годност отбелязан върху опаковката.

Отворената опаковка трябва да се употреби за 28 дни.

След всяко прилагане затворете незабавно шишето.

Лекарствата не бива да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Калиев йодид Унимед Фарма 2%

Активното вещество е: Калиев йодид

Другите съставки са: натриев тиосулфат, натриев хлорид, хлорхексидинов диацетат, натриева сол на ЕДТА, пречистена вода.

Как изглежда Калиев йодид Унимед Фарма 2% и какво съдържа опаковката

Пластмасово шише с капкомер, пластмасова капачка на винт, етикет. Шишето е опаковано в картонена кутия с листовка за пациента.

Големина на опаковката: 1 x 10 ml.

Притежател на разрешението за употреба и производител

UNIMED PHARMA
Oriesjkova 11
821 05 Bratislava
Словашка Република

Дата на последно одобрение на листовката
август/2008

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Унимед Фарма
1164 София
Ул. „Кричим” №65
България
Тел.: 868 52 71

