

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА
DOXUSYCLIN ASTAVIS
ДОКСИЦИКЛИН АКТАВИС



ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ЛИСТОВКА ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОЗИ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

- *Запазете тази листовка! Може да се наложи да я прочетете отново.*
- *Ако у Вас възникнат допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекуващ лекар или към фармацевт!*
- *Този продукт е предписан лично за Вас и не трябва да се дава на друг! Той може да навреди на други хора, дори ако те имат подобни на Вашите оплаквания.*

В ТАЗИ ЛИСТОВКА СЕ СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

- 1. Какво представлява Доксициклин Актавис и за какво се прилага**
- 2. Какво е необходимо да знаете преди приложението на Доксициклин Актавис**
- 3. Как се прилага Доксициклин Актавис**
- 4. Възможни нежелани реакции**
- 5. Условия на съхранение**
- 6. Допълнителна информация**

Доксициклин Актавис твърди желатинови капсули 100 mg

Лекарствено вещество в 1 твърда желатинова капсула: Doxusycline hyclate, екв. на Doxusycline 100 mg

Доксициклин Актавис 6 капсули в блистер от PVC/алуминиево фолио
1 блистер в картонена кутия

Притежател на разрешението за употреба

Актавис ЕАД
Бул. "Княгиня Мария Луиза" №2
1000 София, България
Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Производител

"Балканфарма-Разград" АД
бул. "Априлско въстание" №68
Разград-7200
Тел. 084615318



1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДОКСИЦИКЛИН АКТАВИС И ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА

Доксициклин Актавис е широкоспектърен антибиотик от групата на тетрациклините, който е се приема през устата и е с изразено действие срещу голям брой микроби. Потиска синтеза на белтъците в микробната клетка.

Доксициклин Актавис се прилага за лечение на инфекции, причинени от чувствителни към него микроорганизми:

- инфекции на дихателните пътища - тонзилити, фарингити, отити, синусити, бронхити, пневмонии, бронхопневмонии;
- инфекции на жлъчните пътища;
- урогенитални инфекции (пикочо-полови) - уретрити, цистити, пиелонефрити, простатити;
- инфекции на малкия таз - чревна амебиаза и други;
- интестинални (коремни) инфекции;
- инфекции на кожата и меките тъкани - импетиго, целулит, фурункулоза, акне, инфектирани травматични и следоперативни рани;
- други инфекции - остеомиелит, тромбофлебит, възпаление на тъканите на окото;
- инфекции от специфични причинители – пситакоза, трахома, рикетсиози, чума, туларемия, холера, бруцелоза, Лаймска болест, лептоспироза, сифилис (при пациенти с алергия към пеницилини), антракс.

2. КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ЗА ЗАПОЧНЕТЕ ЛЕЧЕНИЕТО С ДОКСИЦИКЛИН АКТАВИС

Доксициклин Актавис не се прилага при:

- свръхчувствителност към тетрациклини;
- тежки нарушения на чернодробната функция;
- деца под 8 годишна възраст, поради риск от трайно оцветяване на зъбите и рядко хипоплазия на емайла.

При приложението на този лекарствен продукт имайте предвид следното:

Доксициклин Актавис се прилага с повишено внимание при пациенти с увредена чернодробна функция поради опасност от натрупването му.

Продуктът се прилага с повишено внимание и при пациенти с увредена лигавица на хранопровода и язвена болест на стомаха и дуоденума.

По време на лечението да се избягва излагане на пряка слънчева светлина поради повишена фоточувствителност.

По време на лечението с Доксициклин Актавис е възможно развитието на допълнителни инфекции, както и микози (гъбични заболявания). Възможно е усложняване на съществуваща вагинална кандидоза.

В готовата лекарствена форма се съдържа лактоза, която е неподходяща при пациенти с лактазна недостатъчност, галактоземия или глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция.

Приложение на Доксициклин Актавис и прием на храни и напитки
Няма данни за необходимост от специален хранителен режим или ограничения на определени видове храни и напитки по време на лечението с този продукт.



Бременност

Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт

Доксициклин Актавис не се прилага по време на бременност.

Кърмене

Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт

Продуктът не се прилага по време на кърмене.

Шофиране и работа с машини

Доксициклин Актавис не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Приемане на други лекарства

Моля, информирайте своя лекуващ лекар или фармацевт ако приемате или сте приемали скоро други лекарствени продукти, дори ако те не са Ви били предписани от лекар

Комбинираното прилагане на продукти, съдържащи калций, магнезий, алуминий или желязо с Доксициклин Актавис намалява значително усвояването на антибиотика.

Барбитурати, карбамазепин и фенитоин намаляват действието му.

Доксициклин Актавис засилва токсичните ефекти на литиевите соли и общите анестетици върху черния дроб и бъбреците.

Продуктът подпомага противосъсирващата активност на индиректните антикоагуланти, което налага намалаване на дозата им.

Химиотерапевтичният ефект на Доксициклин Актавис може да бъде намален при едновременната му употреба с ензимни индуктори.

Продуктът не се комбинира с ретиноиди, поради риск от повишаване на вътречерепното налягане.

Доксициклин Актавис може да потисне ефекта на оралните контрацептиви.

3. КАК СЕ ПРИЛАГА ДОКСИЦИКЛИН АКТАВИС

Винаги приемайте Доксициклин Актавис според инструкциите на лекуващия лекар!

Доксициклин Актавис се приема с повече течности, за да се избегне дразнене на лигавицата на хранопровода и стомаха. Ако такова настъпи продуктът може да се приема с храна. Антибиотикът трябва да се прилага най-малко 1 час преди лягане.

Възрастни: Обичайната дозировка на продукта е 200 mg, разпределена в два приема през 12 часа първия ден и по 100 mg дневно през следващите 6 дни.

По преценка на лекаря през целия курс на лечение може да се приемат по 100 mg на 12 часа.

При неусложнен гонококов уретрит у мъже се прилагат 100 mg два пъти дневно в продължение на 7 дни. Като алтернатива може да се приложи единична доза от 300 mg, последвана от още 300 mg в следващия час.

При първичен и вторичен сифилис лечението се провежда с доза 200 mg дневно в два приема в продължение на 1-4 седмици в зависимост от стадия на процеса.



Деца над 8 години и телесно тегло над 50 kg: Прилагат се дневни дози от 4 mg/kg телесно тегло.

Доксициклин Актавис в обичайни дози може да се прилага при пациенти с бъбречна недостатъчност.

Ако сте приели по-голямо количество от лекарството:

При прием на по-висока доза от предписаната веднага се обърнете за помощ към лекар!

В случай на предозиране с Доксициклин Актавис лечението се прекратява и се назначава симптоматично лечение. Хемодиализа не е подходяща поради незначителното ѝ участие в екскрецията на продукта.

Ако сте пропуснали да приложите Доксициклин Актавис:

Ако сте пропуснали да приемете поредната доза, то приемете пропуснатата час по-скоро, но се не я приемайте едновременно със следващата.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всеки друг лекарствен продукт, Доксициклин Актавис може за предизвика нежелани лекарствени реакции

Могат да се наблюдават:

- анорексия (безапетитие), гадене, повръщане, диария; при продължителна употреба и в по-високи дози е възможна поява на язви в лигавицата на хранопровода, затруднения в гълтането, гъбички в устната кухина;
- кожни реакции - обриви, по-рядко тежки кожни реакции като ексфолиативен дерматит, фоточувствителност; влагалищна кандидоза;
- свръхчувствителност - анафилаксия, едем на Квинке, серумна болест, обостряне на съществуващ lupus erythematodes;
- кръвни – промени в броя на кръвните клетки - анемия, тромбоцитопения, неутропения, еозинофилия.

Ако забележите каквито и да е нежелани реакции, които не са отразени в тази листовка, моля съобщете за това на лекуващия лекар или фармацевт.

5. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

При температура под 25⁰С.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Да не се употребява след срока на годност, указан на опаковката!

Срок на годност: 4 (четири) години

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяко допълнителна информация относно този лекарствен продукт се обръщайте към местното представителство на Притежателя на разрешението за употреба.

Актавис ЕАД

Бул. "Княгиня Мария Луиза" №2

1000 София, България

Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Последна актуализация на текста – Септември 2005 г.

