



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

VASONIT 600 mg filmtablets prolonged

ВАЗОНИТ 600 mg филмтаблетки с удължено освобождаване

Моля, прочетете внимателно тази листовка преди да започнете лечение. Тя съдържа информация за Вашето лекарство. Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново. Ако не разбирате нещо, обърнете се към Вашия лекуващ лекар. Това лекарство е предписано лично на Вас и не трябва да го давате на други. То може да им навреди, дори ако симптомите на тяхното заболяване са същите като Вашите. Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

КАКВО СЪДЪРЖА VASONIT (ВАЗОНИТ)?

СЪСТАВ

Една филмтаблетка с удължено освобождаване Вазонит 600 mg съдържа лекарствено вещество пентоксифилин (pentoxifylline) 600 mg.

Помощни вещества: хипромелоза, микрокристална целулоза, кросповидон, колоидален безводен силициев диоксид, магнезиев стеарат, макрогол 6000, титанов диоксид, талк, полиакрилатна дисперсия.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА

Филмтаблетки с удължено освобождаване по 20 броя в опаковка.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H

Schloßplatz 1, A-8502 Lannach, Austria

Австрия

ПРОИЗВОДИТЕЛ

“Фармацевтични заводи Милве” АД

3200 гр. Бяла Слатина, Промислена зона, България

в сътрудничество с Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

Вазонит е лекарствен продукт, съдържащ пентоксифилин от групата на метилксантините със съдоразширяващ ефект. Той усилва кръвотока, понижава вискозитета на кръвта и усилва подвижността на червените кръвни телца. Специалната галенова форма на филмтаблетки с удължено освобождаване осигурява по-продължителното му действие и удължава интервалите на прием.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

- За подобряване на нарушеното периферното кръвообращение – при заболявания на крайниците като периодично накуцване, диабет, тромбоза, трофични язви на подбедриците.
- Мозъчни съдови нарушения – състояния след исхемичен мозъчен инсулт, мозъчна атеросклероза.



- Съдови заболявания на ретината и хориоидеята (тромбоза, запушване на централната артерия или вена на ретината).
- Съдови вестибуларни и слухови нарушения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Свръхчувствителност към пентоксифилин, кофеин, теобромин, теофилин;
- Наскоро прекаран инфаркт на миокарда;
- Мозъчен кръвоизлив;
- Кървене от големи кръвоносни съдове, масивни кръвоизливи;
- Кръвоизлив в ретината;
- Тежки нарушения на бъбречната и чернодробна функции;
- Бременност и кърмене.

Относителни противопоказания: напреднала атеросклероза, придружена с хипертонична болест; тежки нарушения на сърдечния ритъм; силно изразено понижаване на артериалното кръвно налягане.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Преди да започнете лечение с Вазонит уведомете Вашия лекар, ако имате бъбречно заболяване, чернодробно заболяване, атеросклероза съчетана с хипертонична болест, лабилно или ниско артериално кръвно налягане. В тези случаи може да се наложи Вашия лекар да коригира дозата.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Моля, уведомете лекуващия си лекар за всички лекарства, които вземате в момента или сте вземали доскоро, независимо дали са предписани от лекар или сте ги купили без рецепта.

Това е важно, защото Вазонит може да промени активността на някои лекарства или обратно някои лекарства да променят неговите ефекти.

Уведомете лекуващия си лекар, ако приемате:

- Лекарства за лечение на високо артериално кръвно налягане;
- Лекарства за лечение на диабет;
- Противосъсирващи лекарства;
- Циметидин (лекарство за лечение на язвена болест);
- Лекарства, стимулиращи нервната система.

БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ

Уведомете Вашия лекуващ лекар ако сте бременна. Преди да вземете някаво лекарство по време на бременност, непременно се консултирайте с лекуващия си лекар.

Ако сте бременна или кърмите не трябва да приемате Вазонит.

Влияние върху активното внимание, способността за шофиране и работата с машини.

Вазонит трябва да се прилага с внимание при водачи на моторни превозни средства и оператори на машини, тъй като в отделни случаи може да предизвика рязко понижаване на кръвното налягане, придружено с главоболие и светене на свят.



ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА УПОТРЕБА

Дозата и продължителността на лечение се определят от лекуващия лекар.

Обичайната доза е 1 филмтаблетка приемана от 1 до 2 пъти на ден. При пациенти с ниско кръвно налягане или с нарушена бъбречна функция, както и при по-възрастни пациенти, се изисква особено внимание при определяне на дозировката.

Филмтаблетките трябва да се приемат цели с малко течност, след хранене.

Прекъсване на лечението

Не прекъсвайте лечението без консултация с лекар!

Ако имате чувството, че ефектът на лекарството е много силен или твърде слаб, консултирайте се с лекуващия си лекар.

Ако пропуснете поредната доза Вазонит?

Ако пропуснете една доза, вземете я колкото е възможно по-скоро. Ако почти е станало време за следващата доза, вземете я, както обикновено. Не вземайте двойна доза за да компенсирате забравената. Продължете да вземате лекарството, както Ви е предписано.

ПРЕДОЗИРАНЕ

Ако сте приели доза, по-голяма от предписаната, незабавно се посъветвайте с лекуващия лекар.

Симптоми: сърцебиене, зачервяване на лицето, понижаване на кръвното налягане, сънливост, гърчове, загуба на съзнание.

Лечение: лечението е симптоматично и се провежда в здравно заведение.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

При употреба на лекарствения продукт Вазонит могат да възникнат неблагоприятни странични ефекти. Те обаче не се наблюдават задължително при всички пациенти, така че Вие може да не получите никаква реакция.

Рядко могат да се наблюдават: загуба на апетит, тежест в стомаха, гадене, повръщане, чувство за раздуване в коремната област, диария; главоболие, виене на свят, зачервяване на лицето, стенокардни оплаквания, нарушения на сърдечния ритъм; изключително рядко- грипopodobни симптоми, сърбеж, обриви.

При поява на нежелани ефекти, включително и такива, които не са споменати в тази листовка, информирайте лекуващия си лекар.

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

В оригинални опаковки в сухи, защитени от светлина места при температура под 25°C.

Да се съхранява на места недостъпни за деца!

СРОК НА ГОДНОСТ

5 години

Продуктът да не се употребява след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

По лекарско предписание!

Дата на последна редакция: месец юни 2006 г.

